Verzeichniß

DER


GEWAECHSE,

WELCHE

IM GROSSHERZOGLICHEN PRINZENGARTEN

ZU LUDWIGSLUST

CULTIVIRT WERDEN.



1855.

C. H. Beissner.

Topf-Pflanzen.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Abelia	Lindl.	Abelie	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
floribunda	Decais.	Vielblumige „	„	„	1—5	Mexico
(Vesalia „	Mart. et Gal.)					
serrata	Sieb. et Zucc.	Sägerandige „	„	„	„	Nord-China
(uniflora	R. Br.)					
Abutilon	Kth.	Abutilon. . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
striatum	Dicks.	Gestreiftes „	„	„	5—10	Brasilien
venosum	A. Diet.	Geadertes „	„	„	„	„
Acacia	Tourn.	Acazie.	23, C. 1, O.	Leguminosæ		
armata	R. Br.	Bewaffnete „	„	„	1—5	Neu-Süd-Wales
cyanophylla . . .	Lindl.	Blaublättrige „	„	„	„	Neu-Holland
(petiolaris	Lehm.)					
floribunda	W.	Vielblummige „	„	„	„	Port-Jackson
hastulata.	Sm.	Spiesschentrag. „	„	„	„	Neu-Holland
(cordifolia	Hort.)					
lineata	Cunning.	Liniirte „	„	„	„	Neu-Süd-Wales
longifolia.	W.	Langblättrige „	„	„	„	Neu-Holland
microcantha . . .	A. Diet.	Kleindornige „	„	„	„	?
(paradoxa	Hort.)					
nigricans.	R. Br.	Schwärzliche „	„	„	„	Neu-Holland
(rutaefolia	Lk.)					
obliqua	Cunning.	Schiefe „	„	„	„	Neu-Süd-Wales
(rotundifolia . . .	Hort.)					
pulchella.	R. Br.	Schöne „	„	„	„	Neu-Holland
vestita	Ker.	Bekleidete „	„	„	„	Neu-Süd-Wales
Achimenes	P. Br.	Achimenes . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
Böckmanni	Reg.	Böckmann's „	„	„	10—15	Hybride
coccinea grandiflora.	H. Angl.	Grossblumige scharlachrothe „	„	„	„	„
Escheri	Reg.	Escher's „	„	„	„	„
grandiflora	D. C.	Grossblumige „	„	„	„	Mexico
hirsuta	Lindl.	Rauhe „	„	„	„	Guatemala
ignescens	Lem.	Feurige „	„	„	„	„
longiflora alba. . .	(D. C.)	Weisse langblumige „	„	„	„	?
(Jaureguia	Warsz.)					
longiflora azurea . .	Hort.	Azurblaue „ „	„	„	„	?
„ latifolia .	„	Breitblättrige „ „	„	„	„	Hybr.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Achimenes						
pedunculata . . .	Benth.	Gestielte. „	14, C. 2, O.	Personatæ	10—15	Guatemala
picta	„	Bemalte „	„	„	„	„
Rendatleri	Reg.	Rendatler's „	„	„	„	Hybr.
rosea	Lindl.	Rosenrothe „	„	„	„	Guatemala
venusta	Hort.	Reizende „	„	„	„	Hybr.
Actinostrobus . .	Miq.	Strahlzapfen . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
pyramidalis	„	Pyramidenförm. „	„	„	1—5	Neu-Holland
Adenandra	W.	Drüsenbeutel .	5, C. 1, O.	Rutaceæ		
fragrans	R. et Sch.	Duftender „	„	„	1—5	Cap
umbellata	W.	Doldenblüth. „	„	„	„	„
Adiantum	L.	Krullfarren . .	24, C. 1, S.	Filices		
pedatum	L.	Fussförmiger „	„	„	1—5	Nord-Amerika
tenerum	Sw.	Zarter „	„	„	5—10	Chile
Aechmea	R. et P.	Aechmea . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
fulgens	Melin.	Leuchtendrothe „	„	„	10—15	Cayenne
„ discolor . .	H. Angl.	Verschiedenf. „ „	„	„	„	
Aeschynanthus . .	Jack.	Schaamblume .	14, C. 2, O.	Personatæ		
ramosissimus . . .	Wall.	Aestige „	„	„	10—15	Ost-Indien
Agapanthus . . .	Herit.	Liebesblume . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
umbellatus	„	Doldenblüthige „	„	„	1—5	Cap
Agathaea	Cass.	Agathaea . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
amelloides	D. C.	Amellenartige „	„	„	1—5	Cap
Agathosma	W.	Duftstrauch . .	5, C. 1, O.	Rutaceæ		
ambigua	Bartl. et Wendl.	Zweifelhafter „	„	„	1—5	Cap
ciliata	Lk.	Gewimperter „	„	„	„	„
hirta	Vent.	Kurzhaariger „	„	„	„	„
Agave	L.	Agave	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
americana fol. varieg.	(L.)	Bundblättrige amerikanische „	„	„	1—5	Süd-Eur., S.-Am.
geminiflora	Brand.	Paarblüthige „	„	„	10—15	Peru
Albizzia	Duraz.	Albizzie	23, C. 1, O.	Leguminosæ		
lophanta coarctata .	(Benth.)	Gedrängte büschelblüth. „	„	„	1—5	Neu-Holland
(Acacia „ .	W.)					
Aloe	Diosc.	Aloe	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
echinata	W.	Weichstachl. „	„	„	5—10	Cap
socotorina	L.	Socotora „	„	„	„	Ins. Socot., Cap
variegata	„	Bunte „	„	„	„	Cap
Amaryllis	L.	Amaryllis . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
acuminata	Ker.	Zugespitzte „	„	„	5—10	Brasilien
(Hippeastrum pulverulentum . . .	Herb.)					
aulica	Ker.	Kronen „	„	„	„	„
(Hippeastrum „	Herb.)					
crocata	Ker.	Safrangelbe „	„	„	„	„
(Hippeastrum „	Herb.)					
equestris	Ait.	Ritter „	„	„	„	Süd-Amerika
(Hippeastrum „	Herb.)					
formosissima . . .	L.	Schönste „	„	„	„	„
(Sprekelia „	Herb.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Amaryllis						
psittacina	Ker.	Papagaien „	6, C. 1, O.	Amaryllideæ	5—10	Brasilien
(Hippeastrum „	Herb.)					
„ lateritia . .	Bosse	Ziegelrothe „ „	„	„	„	Hybr.
purpurea	Ait.	Purpurrothe „	„	„	„	Cap
(Vallota „	Herb.)					
Reginæ Johnsonii .	Sch. et Fil.	Johnson's Kön. „	„	„	„	Hybr.
(Hippeastrum „	Herb.)					
rutila	Ker.	Röthliche „	„	„	„	Brasilien
(Hippeastrum „	Herb.)					
Amicia	H. et Kth.	Amicie	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
Zygômeris	D. C.	Paartheilige „	„	„	5—10	Mexico
Amomum.	L.	Ingwer	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
Cardamomum . . .	L.	Kardamom „	„	„	10—15	Ost-Indien
Anagallis	Diosc.	Gauchheil . . .	5, C. 1, O.	Primulaceæ		
Monelli grandiflora .	Hort.	Monelli's grossblumiges „	„	„	1—5	Hybr.
Anomatheca . . .	Gawl.	Anomatheca . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
cruenta	Lindl.	Blutrothgefl. „	„	„	„	Cap
Anthurium . . .	Schott.	Schwanzblume .	21, C. 3, O.	Aroideæ		
Beyrichii	Kth.	Beyrich's „	„	„	10—15	Brasilien
digitatum	Schott.	Gefingerte „	„	„	„	Süd-Amerika
(Pothos „	Jacq.)					
Hookeri	Kth.	Hooker's „	„	„	„	Brasilien
macrophyllum . . .	Schott.	Grossblättrige „	„	„	„	West-Indien
(Pothos „ . . .	Sw.)					
Aotus	Sm.	Ohnohr	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
gracillima	Meisn.	Schlankes „	„	„	3—6	Neu-Holland
Ardisia	Sw.	Spitzblume . .	5, C. 1, O.	Sapoteæ		
crenulata.	Vent.	Gekerbte „	„	„	10—15	West-Indien
Armeria	W.	Grasnelke . .	5, C. 5, O.	Plumbagineæ		
latifolia	W.	Breitblättrige „	„	„	1—5	Portugal
Aspidistra	Ker.	Sternschild . .	8, C. 1, O.	Smilaceæ		
punctata variegata .	Lindl.	Bunterpunctirt. „	„	„	10—15 (5—10)	China, Japan
(Plectôgyne „ .	Lk.)					
Aucuba	Thb.	Aucuba	4, C. 1, O.	Cornaceæ		
japonica	Thb.	Japanische „	„	„	1—5	Japan
Baeckea	L.	Baeckea. . . .	8, C. 1, O.	Myrtaceæ		
virgata	Andr.	Ruthenförmige „	„	„	1—5	Neu-Caledonien
Baeothryon . . .	N. v. E.	Kleinbinse. . .	3, C. 1, O.	Cyperaceæ		
pygmæum	A. Diet.	Zwergartige „	„	„	5—10	Ost-Indien
(Scirpus „	Lam.)					
Balsamina	Riv.	Balsamine . . .	5, C. 1, O.	Balsamineæ		
latifolia	D. C.	Breitblättrige „	„	„	5—10	Ost-Indien
Beaufortia	R. Br.	Beaufortie. . .	18, C. 3, O.	Myrtaceæ		
decussata	R. Br.	Kreuzblättrige „	„	„	1—5	Neu-Holland
splendens	Baxt.	Glänzende „	„	„	„	„
(sparsa	R. Br.)					
Begonia	L.	Begonie, (Schiefblatt)	21, C. 7, O.	Begoniaceæ		
argyrostigma . . .	Fisch.	Silberfleckige „	„	„	10—15	Brasilien
(maculata	Radd.)					
coccinea	Hook.	Scharlachrothe „	„	„	„	Orgelgebirge, Brasilien

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Begonia						
crassicaulis	Lindl.	Dickstengliche „	21, C. 7, O.	Begoniaceæ	10—15	Guatemala
(carolineaefolia . .	Hort.)					
discolor	R. Br.	Verschiedenf. „	„	„	5—10	China
Hamiltoniana . . .	Lehm.	Hamilton's „	„	„	10—15	Ost-Indien
heracleïfolia . . .	Schlecht.	Bärenklaubl. „	„	„	„	Mexico
hytrocotilifolia . . .	Hook.	Wassernabelbl. „	„	„	„	?
incarnata	H. Berol.	Fleischfarbige „	„	„	„ (5—10)	Mexico, Brasilien
manicata	Brong.	Manschettige „	„	„	10—15	?
miniata	Pl. et Lind.	Mennigrothe „	„	„	„	Columbien
Mœhringii	Rgl.	Moehring's „	„	„	„	Hybr.
nitida	Ait.	Glänzende „	„	„	„	Jamaika
platanifolia	Schott.	Platanenblättr. „	„	„	„	Brasilien
prestoniensis . . .	Th. Moore	Prestons che „	„	„	„	Hybr.
princeps	Hort.	Fürstliche „	„	„	„	?
punctata	Kltz.	Punctirte „	„	„	„	Mexico
ramentacea	Paxt.	Ausschlagschuppige „	„	„	„	Brasilien
ricinifolia	O. et Dict.	Wunderbaumblättr. „	„	„	„	„
sanguinea	Raddi.	Blutrothe „	„	„	„	„
semperflorens . . .	Lk.	Immerblühende „	„	„	„	„
stigmosa	Lindl.	Genarbte „	„	„	„	Mittel-Amerika
strigillosa	Ott. et Diet.	Striegliche „	„	„	„	„
suaveolens	Haw.	Duftende „	„	„	„	Süd-Amerika
(odorata	W.)					
tomentosa	Schott.	Filzige „	„	„	„	Brasilien
undulata	Schott.	Wellenförmige „	„	„	„	„
zebrina	Hort.	Zebrastreifige „	„	„	„	„
„ sanguinea . .	Hort.	Blutrothe „ „	„	„	„	
Billbergia	Thb.	Billbergie . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
pyramidalis	Lindl.	Pyramidenförm. „	„	„	10—15	Brasilien
zebrina	Lindl.	Zebrastreifige „	„	„	„	„
Biota	Endl.	Biota	21, C. 8, O.	Coniferæ		
orientalis aurea . .	Endl.	Goldfarbige „	„	„	1—5	China, Japan
(Thuja „ „ . .	L.)					
variegata argentea .	Endl.	Silberbunte „	„	„	„	
(Thuja sinensis arg. .	Hort.)					
pendula	Endl.	Hängende „	„	„	„	„
(Thuja filiformis . .	Lodd.)					
Bossiaea	Vent.	Bossiaee . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
microphylla	Sm.	Kleinblättrige „	„	„	1—5	Neu-Holland
Bouvardia	Salisb.	Bouvardie . . .	4, C. 1, O.	Rubiaceæ		
Jacquini	Humb.	Jacquin's „	„	„	1—5	Mexico
(Houstonia coccinea .	Andr.)					
leiantha	Benth.	Glattblumige „	„	„	5—10	Guatemala
Brunia	L.	Brunie	5, C. 1, O.	Bruniaceæ		
lanuginosa	L.	Feinwollige „	„	„	1—5	Cap.
(Berzelia „	Brong.)					
Burchellia	R. Br.	Burchellie . . .	5, C. 1, O.	Rubiaceæ		
capensis	R. Br.	Capische „	„	„	5—10	Cap.
Buxus	L.	Buxbaum . . .	21, C. 4, O.	Euphorbiaceæ		
balearica	Lam.	Balearischer „	„	„	1—5	Balear. Inseln

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Cacteae.						
Cereus	C. Bauh.	Fackeldistel. .	12, C. 1, O.	Cacteæ		
candicans	Gill.	Weissliche „	„	„	10—15	Mendoza
coerulescens . . .	Salm.	Bläuliche „	„	„	„	Mexico
eburneus	Salm.	Elfenbeinweisse „	„	„	„	Chile, Curacao
flagelliformis . . .	Mill.	Peitschenförm. „	„	„	„	Süd-Amerika
„ Scottii . . .	H. Angl.	Scott's „ „	„	„	„	Hybr.
„ Smithii . . .	H. Angl.	Smith's „ „	„	„	„	„
geometrizans . . .	Mart.	Geometrische „	„	„	„	Mexico
grandiflorus	Mill.	Grossblumige „	„	„	„	West-Indien
peruvianus	Tabern.	Peruanische „	„	„	„	Peru
„ monstrosus .	D. C.	Monströse „ „	„	„	„	
serpentinus	Lagas.	Schlangen „	„	„	„	Mexico
speciosissimus . . .	D. C.	Prächtigste „	„	„	„	Mexico, Guatem.
strigosus	H. Angl.	Striegliche „	„	„	„	Chile
Echinocactus . .	D. C.	Igeldistel . . .	„	„		
centeterius	Lehm.	Stachelspitzige „	„	„	„	Brasilien
cornigerus	D. C.	Hörnertragende „	„	„	„	Mexico, Guatem.
Ottonis	Lehm.	Otto's „	„	„	„	Mexico
Scopa	H. Ber.	Besen „	„	„	„	Brasilien
„ candidus . .	Pfei.	Schneeweisse „	„	„	„	
spiralis	Karw.	Spiralförmige „	„	„	„	Mexico
Echinopsis	Zucc.	Kugeldistel . .	„	„		
Eyriesii	Zucc.	Eyries „	„	„	„	Buenos-Ayres
multiplex	Zucc.	Vielfache „	„	„	„	Brasilien
oxygona	Zucc.	Scharfkantige „	„	„	„	„
turbinata	Zucc.	Kreiselförmige „	„	„	„	?
Zuccarinii	Pfr.	Zuccarini's „	„	„	„	?
Epiphyllum . . .	Herm.	Blattdistel . .	„	„		
truncatum	Haw.	Abgestutzte „	„	„	„	Brasilien
„ Altensteinii	Pfr.	Altenstein's „ „	„	„	„	„
„ bicolor . .	Hort.	Zweifarbige „ „	„	„	„	
„ coccineum .	Hort.	Scharlachrothe „ „	„	„	„	
Malacocarpus . .	Salm.	Weichfrucht . .	„	„		
corynodes	Salm.	Keulenartige „	„	„	„	Mex., Montevideo
(Echinocactus „ . .	Pfr.)					
Mammillaria . . .	Haw.	Warzendistel .	„	„		
chrysacantha . . .	H. Ber.	Goldstachlige „	„	„	„	Mexico
cirrhifera	Mart.	Rankenstachl. „	„	„	„	„
discolor	Haw.	Verschiedenfarb. „	„	„	„	„
gracilis	Pfr.	Schlanke „	„	„	„	„
Karwinskiana . . .	Mart.	Karwinski's „	„	„	„	„
Parkinsonii	Ehrb.	Parkinson's „	„	„	„	„
polythele	Mart.	Vielwarzige „	„	„	„	„
simplex	Haw.	Einfache „	„	„	„	Antillen, La Guayra
tenuis	D. C.	Dünne „	„	„	„	Mexico
Melocactus . . .	C. Bauh.	Melonendistel .	„	„		
amoenus	Hoffmg.	Angenehme „	„	„	„	Columbia
Opuntia	Adans.	Feigendistel . .	„	„		
leucotricha	D. C.	Weisshaarige „	„	„	„	Mexico
microdasys	Lehm.	Kleinhäufige „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Peirescia	Plum.	Peirescie . . .	12, C. 1, O.	Cacteæ		
Bleo	D. C.	Bleo „	„	„	10—15	Neugran., Mex.
Phyllocactus . .	Lk.	Blattstamm-distel .	„	„		
hybr. Conway's Giant	Gard. Chr.	Conway's Riesen .	„	„	„	Hybride
„ grandiflorus .	Hort.	Grossblumige „	„	„	„	„
„ Makoyi . . .	Hort.	Makoy's „	„	„	„	„
„ pulchellus . .	Hort.	Schöne „	„	„	„	„
„ speciosissimus .	Hort.	Prächtigste „	„	„	„	„
phyllanthoides . . .	D. C.	Blattblumige „	„	„	„	Mexico
„ coccineus . .	Hort.	Scharlachrothe „ „	„	„	„	Hybr.
Pilocereus	Lem.	Haarkerze . . .	„	„		
Curtisii	Salm.	Curtis „	„	„	„	Antillen
(Cereus Royeni . .	Haw.)					
Rhipsalis	Gärt.	Ruthendistel. .	„	„		
pachyptera	Pfr.	Dickflüglige „	„	„	„	West-Indien
paradoxa	Salm.	Wunderbare „	„	„	„	Brasilien
salicornioides . . .	Haw.	Glasschmalzart. „	„	„	„	„
Caladium	Vent.	Schönaron. . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
bicolor	Vent.	Zweifarbiges „	„	„	10—15	Brasilien
poecile	Schott.	Buntes „	„	„	„	?
violaceum	Desf.	Violettes „	„	„	„	Antillen
Calceolaria . . .	Feuill.	Schuhblume . .	2, C. 2, O.	Personatæ		
hybrida variet. . .	Hort.	Bastard „	„	„	1—5	Hybr.
salicifolia multiflora .	Hort.	Vielblumige weidenblättrige „	„	„	„	„
Callistemon . . .	R. Br.	Schönfaden . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
lanceolatum	(D. C.)	Lilablüthiger lanzettblättriger „	„	„	„	Hybr.
lilacinum . . .	H. Hamb.					
„ semperflorens .	Hort.	Immerblühender „	„	„	„	Neu-Holland
speciosum	D. C.	Prächtiger „	„	„	„	„
Callitris	Vent.	Schönzweigler .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
quadrivalvis . . .	Vent.	Vierklappiger „	„	„	1—5	Nördl. Afrika
(Thuja articulata . .	Vahl.)	(Sandraklebensbaum)				
Calluna	Salisb.	Besenheide . .	8, C. 1, O.	Ericeæ		
vulgaris fl. pl. . . .	„	Gefüllte gemeine „	„	„	1—5	(Deutschland)
Calodracon . . .	Planch.	Schöndrachenbaum . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
heliconiæfolius . . .	Planch.	Heliconienblättr. „	„	„	10—15	China
(Cordyline „ . .	Ott. et Diet.)					
(„ Eschscholtziana	Mart.)					
(Dracæna brasiliensis	Hort.)					
Jacquinii astrosanguineus . . .	Planch.	Jacquin's schwarzrother „	„	„	„	„
(Dracæna ferrea . .	L.)					
Jacquinii purpureo-variegatus . .	Planch.	Purpurbunter „	„	„	„	„
(Dracæna terminalis .	W.)					
Sieboldii	Planch.	Siebold's „	„	„	„	Japan
(Dracæna nobilis . .	Hort.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Calothamnus . . .	Labill.	Schönstrauch .	18, C. 3, O.	Myrtaceæ		
quadrifida	R. Br.	Vierspaltiger „	„	„	1—5	Neu-Holland
Camellia.	L.	Camellie . . .	16, C. 9, O.	Camelliaceæ		
japonica	L.	Japanische „	„	„	5—10	Japan, China Hybride
„ Aitonia	—	Aiton's „ „	„	„	„	
„ alba pl.	Lodd.	Weissgefüllte „ „	„	„	„	„
„ Albertus	Chand.	Albert's „ „	„	„	„	„
„ Alexina	Low.	Alexina's „ „	„	„	„	„
„ altheæflora . . .	Chand.	Malvenblüthige„ „	„	„	„	„
„ anemoneflora . .	—	Anemonenblüth. „	„	„	„	„
„ Arciduchessa Augusta	—	Erzherzogin Augusten's „ „	„	„	„	„
„ atrorubens . . .	—	Schwarzrothe „ „	„	„	„	„
„ Augusta	—	Augusten's „ „	„	„	„	„
„ Baronne d'Udekem	Makoy	Baroness d'Udekem's „ „	„	„	„	„
„ Belle de Wilh.-Höhe	—	Schöne von Wilhelmshöhe „ „	„	„	„	„
„ Brownii	—	Brown's „ „	„	„	„	„
„ Buckliana	—	Buckli's „ „	„	„	„	„
„ candidissima . . .	—	Weisseste „ „	„	„	„	„
„ Carswelliana . . .	—	Carswell's „ „	„	„	„	„
„ Cavendishii . . .	—	Cavendish's „ „	„	„	„	„
„ Chandlerii. . . .	Chand.	Chandler's „ „	„	„	„	„
„ Cliveana	—	Clive's „ „	„	„	„	„
„ Colvillii	—	Colvill's „ „	„	„	„	„
„ concinna	—	Angenehme „ „	„	„	„	„
„ conspicua	Beck.	Ansehnliche „ „	„	„	„	„
„ Coquetti	—	Gefallsüchtige „ „	„	„	„	„
„ corallina	Chand.	Corallenrothe „ „	„	„	„	„
„ cruciata	—	Kreuzförmige „ „	„	„	„	„
„ decora	—	Geschmückte „ „	„	„	„	„
„ delicatissima . . .	—	Zärtlichste „ „	„	„	„	„
„ Donkelärii . . .	—	Donkelär's „ „	„	„	„	„
„ Dorsettii	—	Dorsett's „ „	„	„	„	„
„ Duchesse d'Orleans	—	Herzogin von Orlean's „ „	„	„	„	„
„ Egertonia	—	Egerton's „ „	„	„	„	„
„ excelsa	—	Hohe „ „	„	„	„	„
„ fimbriata	Lodd.	Gefranzte „ „	„	„	„	„
„ Fordii	—	Ford's „ „	„	„	„	„
„ Francofurtensis . .	—	Frankfurter „ „	„	„	„	„
„ Fréderic le Grand .	—	Friederich des Grossen „ „	„	„	„	„
„ Hendersonii . . .	—	Henderson's „ „	„	„	„	„
„ Henri Favre . . .	—	H. Favre's „ „	„	„	„	„
„ heteropetala alba .	—	Weisse verschiedenblättrige „ „	„	„	„	„
„ Hosackii	—	Hosack's „ „	„	„	„	„
„ imbricata	—	Dachziegelförmige „ „	„	„	„	„
„ „ alba . . .	—	Weisse „ „ „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Camellia.						
„ Imperatrice Josephine. . . .	—	Kaiserin Josephinen's „ „	16, C. 9, O.	Camelliaceæ	5—10	Hybride
„ incarnata	Lodd.	Fleischfarbige „ „	„	„	„	„
„ Lady Grafton . .	—	Frau Grafton's „ „	„	„	„	„
„ Leblanc's red . .	—	Leblanc's rothe „ „	„	„	„	„
„ Leeana superba .	—	Lee's stolze „ „	„	„	„	„
„ Maddalena . . .	—	Maddalena's „ „	„	„	„	„
„ Marchioness of Exeter	—	Markgräfin von Exeter's „ „	„	„	„	„
„ Maria Luigia di Parma	—	Marie Louisen's von Parma „ „	„	„	„	„
„ Master's double red	—	Meister's rothgefüllte „ „	„	„	„	„
„ Melinetti	—	Melinetti's „ „	„	„	„	„
„ minuta	—	Kleine „ „	„	„	„	„
„ neoboracensis . .	—	Neuyorkische „ „	„	„	„	„
„ nobilissima . . .	—	Edelste „ „	„	„	„	„
„ oxoniensis. . . .	—	Exmoutsche „ „	„	„	„	„
„ pæoniæflora . . .	Lodd.	Pæonienblüth. „ „	„	„	„	„
„ pendula	Chand.	Hängende „ „	„	„	„	„
„ pictorum coccinea.	—	Scharlachrothe bemalte „ „	„	„	„	„
„ picturata	—	Bemalte „ „	„	„	„	„
„ pomponia pl. . .	Lodd.	Geschmückte „ „	„	„	„	„
„ „ rosea pl. .	—	Rosenrothe „ „ „	„	„	„	„
„ Prattii	—	Pratt's „ „	„	„	„	„
„ Princess Bacciochi.	—	Prinzess Bacciochi's „ „	„	„	„	„
„ resplendens . . .	—	Glänzende „ „	„	„	„	„
„ revoluta . . . . (myrtifolia)	—	Zurückgerollte „ „	„	„	„	„
„ rosa sinensis . . .	Lodd.	Chineserrosen „ „	„	„	„	„
„ Rossii	—	Rossen's „ „	„	„	„	„
„ rubricaulis nova .	—	Rothstenglige „ „	„	„	„	„
„ Saccoi nova . . .	—	Sacco's „ „	„	„	„	„
„ Spofforthiana . .	—	Spofforth's „ „	„	„	„	„
„ squamosa	—	Schuppige „ „	„	„	„	„
„ sulcata	—	Gefurchte „ „	„	„	„	„
„ superbissima nova.	—	Prächtigste „ „	„	„	„	„
„ Teutonia	Grüneb.	Verbundene „ „	„	„	„	„
„ Theresiana . . .	—	Theresen's „ „	„	„	„	„
„ Traversii	—	Traver's „ „	„	„	„	„
„ tricolor	—	Dreifarbige „ „	„	„	„	„
„ triumphans . . .	—	Triumphirende „ „	„	„	„	„
„ variegata pl.. . .	Lodd.	Gef. bunte „ „	„	„	„	„
„ Weymourii . . .	—	Weymour's „ „	„	„	„	„
„ Woodsii	—	Wood's „ „	„	„	„	„
reticulata	Lindl.	Netzadrige „	„	„	„	China
Sasanqua rosea pl. .	Thb.	Gef. rosenrothe „	„	„	„	Japan

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Campanula. . . .	Dodon.	Glockenblume „	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
fragilis hirsuta . .	A. D. C.	Rauhe zerbrechlige „	„	„	1—5	Italien, Sicilien
garganica	Ten.	Garganische „	„	„	„	Garganogebirge, (Neapel)
pyramidalis	L.	Pyramidenförm. „	„	„	„	Italien, Krain
rhomboidalis fl. pl. .	L.	Gef. rautenblätt. „	„	„	„	Italien, Krain
Vidalii	Watson.	Vidal's „	„	„	„	Azorische Inseln
Canna	C. Gesn.	Blumenrohr . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
discolor	Lindl.	Verschiedenfarb. „	„	„	5—10	Trinidad, Mittel-Amerika
macrophylla . . .	Hort.	Grossblättriges „	„	„	„	?
Sellowii	H. Ber.	Sellow's „	„	„	„	Brasilien
Warscewiczii . . .	Ott. et Diet.	Warscewicz „	„	„	„	Mittel-Amerika
Cantua	Juss.	Zauberstrauch .	5, C. 1, O.	Polemoniaceæ		
dependens	Lindl.	Herabhängender „	„	„	5—10	Peru
Carmichaëlia. . .	R. Br.	Carmichaëlie .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
australis	R. Br.	Südliche „	„	„	1—5	Neu-Seeland
Casuarina	L.	Kasumbaum . .	21, C. 1, O.	Casuarineæ		
equisetifolia. . . .	Forst.	Schachtelhalmblättriger „	„	„	1—5	Neu-Holland
torulosa	Ait.	Angeschwollen. „	„	„	„	„
Centradenia . . .	G. Don.	Sporndrüse . .	8, C. 1, O.	Melastomaceæ		
floribunda	Planch.	Vielblumige „	„	„	5—10	Guatemala
Centrostemma . .	Decais.	Spornkranz . .	5, C. 2, O.	Asclepiadeæ		
multiflorum	Decais.	Vielblumiger „	„	„	10—15	Java
(Cyrtoceras reflexum	Benth.)					
Cephalotaxus . .	Sieb. et Zucc.	Kopfeibe . . .	23, C. 13, O.	Coniferæ		
tartiva	Sieb.	Späte „	„	„	1—5	Japan
(Taxus adpressa . .	Hort.)					
Chamaedorea . .	W.	Bergpalme. . .	6, C. 1, O.	Palmæ		
elegans	Mart.	Zierliche „	„	„	10—15	Mexico
Chamaerops . . .	Dalech.	Zwergpalme . .	23, C. 2, O.	Palmæ		
humilis	L.	Niedrige „	„	„	5—10	Span., Nordafrik.
Charlwoodia . . .	Sweet.	Charlwoodie . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
congesta	Sweet.	Gedrängte „	„	„	10—15	Neu-Holland
(Cordyline „	Kth.)					
rubra	Planch.	Rothe „	„	„	„	„
(Cordyline „	Hügel.)					
spectabilis	Planch.	Ansehnliche „	„	„	„	„
(Cordyline „	Kth.etBouch.)					
(Dracaena longifolia	Hort.)					
stricta	Sweet.	Steife „	„	„	„	„
(Cordyline „	Kth.)					
Chirita	Don.	Chirita	14, C. 2, O.	Personatæ		
sinensis	Lindl.	Chinesische „	„	„	10—15	China
Chlorôphytum . .	Ker.	Grünpflanze . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Sternbergianum . .	Steud.	Sternberg's „	„	„	5—10	Cap
(Cordyline vivipara .	Hort.)					
Chorozëma. . . .	Labill.	Kreisfahne. . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
varium macrophyllum	Benth.	Grossblättrige veränderliche „	„	„	1—5	(Neu-Holland)

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Citrus	Plin.	Citronen-Orangen u. Pomeranzen-Baum	18, C. 3, O.	Aurantiaceæ		
Aurantium	Risso.	Apfelsinenorange	"	"	1—5	Asien, Ind. (Ital.)
" rubrum .	—	Rothsaftige " "	"	"	"	"
australis	Cunning.	Südliche P.	"	"	"	?
Bergamia Mellarosa .	—	Mellarosa Bergamotten-O.	"	"	"	"
japonica	Thb.	Japanische P.	"	"	"	Japan, China
Limonum amalphitanum	—	Amalfischer Limonenbaum	"	"	"	Asien, Ind. (Ital.)
medica parva . . .	Risso.	Kleinfrüchtige C.	"	"	"	"
" tricolor . . .	—	Dreifarbige C.	"	"	"	"
" variegata. . .	—	Bunte C.	"	"	"	"
nobilis.	Lour.	Edle C.	"	"	"	"
Pompelmos crispatus	—	Gekräuselte Pompelmus	"	"	"	"
sinensis	—	Chinesische C.	"	"	"	"
vulgaris	Risso.	Pomeranze, (oder Bigaradie)	"	"	"	"
" cyathifera . . .	—	Bechertragende P.	"	"	"	"
" Grand Bourbon .	—	Grosse Bourb. P.	"	"	"	"
" hispanica . . .	—	Spanische P.	"	"	"	"
" latifolia varieg. .	—	Bunte breitblättr. P.	"	"	"	"
" macrocarpa. . .	—	Grossfrüchtige P.	"	"	"	"
" stellata	—	Sternförmige P.	"	"	"	"
" undulata. . . .	—	Wellenblättrige P.	"	"	"	"
Clematis.	Diosc.	Waldrebe . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
azurea grandiflora .	Sieb.	Grossblum. blaue "	"	"	1—5	Japan
florida bicolor . . .	Thb.	zweifarb. vollblu. "	"	"	"	"
Clerodendron . .	L.	Loosbaum . . .	14, C. 2, O.	Viticeæ		
fragrans	Vent.	Duftender "	"	"	5—10	Japan
Clethra	L.	Clethra	10, C. 1, O.	Ericeæ		
arborea	Ait.	Baumartige "	"	"	1—5	Madeira
Clianthus	Soland.	Prachtblume. .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
puniceus	Soland.	Hochrothe "	"	"	1—5	Neu-Seeland
Clivia	Lindl.	Clivie	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
nobilis.	Lindl.	Edle "	"	"	5—10	Cap
Coleonema	Bart. et Wend.	Scheidenfaden .	5, C. 1, O.	Rutaceæ		
album	Bart. et Wend.	Weisser "	"	"	1—5	Cap
(Diosma alba . . .	Thb.)					
pulchrum.	Hook.	Schöner "	"	"	"	"
Coleus.	Lour.	Fadenscheide .	14, C. 1, O.	Labiatæ		
Blumei	Benth.	Blume's	"	"	10—15	Java
Colocasia	Raj.	Colocasie . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
antiquorum	Schott.	Aegyptische "	"	"	10—15	Aegypt., O.-Ind.
Mafaffa	?	Mafaffa "	"	"	"	?
odora	Brong.	Riechende "	"	"	"	Ost-Indien
(Caladium " . . .	Roxb.)					
Columnea	Plum.	Columnea . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
crassifolia	A. Brong.	Dickblättrige "	"	"	10—15	Caracas
Schiedeana	Schlecht.	Schiede's "	"	"	"	Mexico

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Conoclinium . . .	D. C.	Kegellager . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
cœlestinum nanum .	(D. C.)	Niedriges himmelblaues „	„	„	1—5	(Carolin., Virgin.)
Cordyline	Commers.	Keulenwurzel .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
cannæfolia	R. Br.	Blumenrohrblätt. „	„	„	10—15	Neu-Holland
cernua	Planch.	Gebeugte „	„	„	„	Mauritius
(Dracæna „ . . .	Jacq.)					
Fontanesiana . . .	Planch.	Fontane's „	„	„	„	Insel Bourbon
(Dracæna „ . . .	Schult.)					
fragrans	Planch.	Duftende „	„	„	„	Guinea, Sierra Leone
(Dracæna „ . . .	Gawl.)					
(Aletris „ . . .	L.)					
marginata	Göppert.	Geränderte „	„	„	„	Madagascar
(Dracæna „ . . .	Lam.)					
(„ tessellata . .	W.)					
Rumphii	Hook.	Rumph's „	„	„	„	Amboina, Java
umbraculifera . . .	Göppert.	Schirmartige „	„	„	„	Ost-Indien, Java
(Dracæna „ . . .	Jacq.)					
Correa.	Sm.	Correa	8, C. 1, O.	Rutaceæ		
speciosa	Andr.	Prächtige „	„	„	1—5	Neu-Holland
Crassula.	Dill.	Dickblatt . . .	5, C. 5, O.	Crassulaceæ		
spathulata	Thb.	Spatelförmiges „	„	„	1—5	Cap
Crinum	L.	Hakenlilie. . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
amabile	Ker.	Liebliche „	„	„	10—15	Ost-Indien
bracteatum	W.	Beblätterte „	„	„	„	„
erubescens	Ait.	Röthliche „	„	„	„	Süd-Amerika
Cryptomeria . . .	D. Don.	Cryptomerie. .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
japonica	D. Don.	Japanische „	„	„	1—5	Japan
(Cupressus „ . . .	Thb.)					
Cuphëa	P. Br.	Höckerblume .	11, C. 1, O.	Lythrariæ		
ignea	A. D. C.	Feurige „	„	„	1—5	Mexico
Cupressus	L.	Cypresse . . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
funebris	Endl.	Trauer „	„	„	1—5	China
glauca.	Lamb.	Graugrüne „	„	„	„	Ost-Ind., Portug.
„ libanensis . . .	Hort.	Libanotische „ „	„	„	„	Libanon
Goveniana	G. Gord.	Goven's „	„	„	„	Californien
japonica pendula. .	Thb.	Häng. japanische „	„	„	„	Japan
macrocarpa	Hartw.	Grossfrüchtige „	„	„	„	Californien
(Lambertii	G. Gord.)					
sempervirens expansa	Targ.	Ausgebreitete immergrüne „	„	„	„	Süd-Europa
„ pyramidalis . .	Targ.	Pyramiden „ „	„	„	„	„
Reinwardtii	?	Reinwardt's „	„	„	„	?
torulosa	D. Don.	Angeschwollene „	„	„	„	Nepal
„ pendula . . .	Hort.	Hängende „ „	„	„	„	
Curcûligo	Gärt.	Rüssellilie . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
recurvata	Dryan.	Zurückgekrümmt. „	„	„	10—15	Java
Cycas	L.	Sagopalme . .	22, C. 12, O.	Cycadeæ		
revoluta	Thunb.	Zurückgerollte „	„	„	10—15	Japan, China
Cyclamen	Nicand.	Erdscheibe . .	5, C. 1, O.	Primulaceæ		
Coum	Mill.	Rundblättrige „	„	„	1—5	Süd-Europa, Griechenland

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Cyclamen.						
europæum	L.	Europäische „	5, C. 1, O.	Primulaceæ	1—5	Süd-Deutschland
„ fl. albo . .	—	Weissblumige „ „	„	„	„	„
hederæfolium . . .	Ait.	Epheublättrige „	„	„	„	Süd-Europa
„ neapolitanum	Ten.	Neapolitanische „	„	„	„	Italien
persicum	Mill.	Persische „	„	„	„	Griechenland
„ aleppicum .	Fisch.	Aleppische „ „	„	„	„	Syrien
„ maculatum .	Hort.	Gefleckte „ „	„	„	„	
repandum	Sibth.	Ausgeschweifte „	„	„	„	Griechenland
vernum	Sweet.	Frühling's „	„	„	„	Süd-Europa
Cyperus	L.	Cyperriet . . .	3, C. 1, O.	Cyperaceæ		
alternifolius	L.	Wechselblättrig. „	„	„	10—15	Madagaskar
Cytisus	L.	Bohnenbaum. .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
Attleanus	Hort.	Attlean's „	„	„	1—5	?
chrysobotrys . . .	Fisch.	Goldtraubiger „	„	„	„	Canarische Ins.
Dacrydium. . . .	Soland.	Harzeibe . . .	22, C. 13, O.	Coniferæ		
cupressinum . . .	Soland.	Cypressenartige „	„	„	1—5	Neu-Seeland
Franklini.	Hook. Fil.	Franklin's „	„	„	„	Tasmannien (Van-Diemens-Land)
Dammara	Rumph.	Dammartanne .	22, C. 10, O.	Coniferæ		
australis	Lamb.	Australische „	„	„	1—5	Neu-Seeland
(Agathis „ . . .	Lindl.)					
Daphne	Diosc.	Seidelbast. . .	8, C. 1, O.	Thymeleæ		
hybr. Dauphin. . .	Hort.	Bastard „	„	„	1—5	Hybr.
odora	Thb.	Wohlriechender „	„	„	„	Japan, China
Daviesia.	Sm.	Daviesie . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
latifolia	R. Br.	Breitblättrige „	„	„	1—5	Neu-Holland
Dianthus.	L.	Nelke	10, C. 2, O.	Caryophylleæ		
Caryophyllus sæpeflorus pleno . .	Hort.	Gef. Oefterblüh. Garten „	„	„	5—10	Hybr.
japonicus	Thb.	Japanische „	„	„	1—5	Japan
Dichorisandra . .	Mican.	Doppelbeutel .	6, C. 1, O.	Commelineæ		
ovalifolia.	Presl.	Ovalblättriger „	„	„	10—15	Panama, (Neu-Granada)
Dieffenbachia . .	Schott.	Dieffenbachie .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
Sequine maculata .	Schott.	Giftige „	„	„	10—15	West-Indien
(Caladium „ . . .	Vent.)					
Dillwynia	Sm.	Dillwynie . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
floribunda	Sm.	Vielblüthige „	„	„	5—10	Neu-Holland
Dracaena	Vand.	Drachenbaum. .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Bœrhaavii	Tenore.	Bœrhaave's „	„	„	10—15	Ost-Indien Canarische Ins.
(Draco pendulifolia .	Hayne.)					
Dracaenopsis . .	Planch.	Drachenbaumart	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
australis	Planch.	Südliche „	„	„	10—15	Neu-Seeland
(Dracæna „ . .	Hook.)					
(Cordyline „ . .	Kth.)					
indivisa	Planch.	Ungetheilte „	„	„	„	„
(Dracæna „	Forst.)					
(Cordyline „	Kth.)					
Echeveria	D. C.	Echeverie . . .	10, C. 4, O.	Crassulaceæ		
secunda	Mühlpf.	Einseitige „	„	„	5—10	Mexico

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Epacris	Forst.	Felsenbusch . .	5, C. 1, O.	Ericeæ		
impressa	Labill.	Eingedrückter „	„	„	1—5	Neu-Holland
miniata	Paxt.	Mennigrother „	„	„	„	„
hybr. alba	Hort.	Weisser Bastard„	„	„	„	Hybr.
„ Attleana. . . .	Hort.	Attle's „ „	„	„	„	„
„ Prinz Rohan . .	Hort.	Prinz Rohan's „ „	„	„	„	„
„ refulgens . . .	Hort.	Glänzender „ „	„	„	„	„
Eranthemum . . .	R. Br.	Frühlingsblume	2, C. 1, O.	Personatæ		
nervosum	R. Br.	Gerippte „	„	„	10—15	Ost-Indien
Erica	Theoph.	Heide	8, C. 1, O.	Ericeæ		
arborea	L.	Baumartige „	„	„	1—5	Süd-Europa
Bowieana	Lodd.	Bowie's „	„	„	„	Cap
gracilis autumnalis .	(Salisb.)	Dünne Herbst „	„	„	„	(Cap)
herbacea	L.	Krautartige „	„	„	„	Süd-Deutschland
hyemalis	Hort.	Winter „	„	„	„	Hybr. ?
mediterranea . . .	L.	Mittelländische „	„	„	„	Süd-Europa
persoluta alba . . .	L.	Weisse ausgebr. „	„	„	„	Cap
polytrichifolia . . .	Salisb.	Haarmoosblättr. „	„	„	„	„
rubens	Thb.	Röthliche „	„	„	„	„
Sindryana	Hort.	Sindry's „	„	„	„	Hybr.
verticillata major . .	(Andr.)	Grosse quirlförmige „	„	„	„	(Cap)
Wilmoreana. . . .	Knowl.	Wilmor's „	„	„	„	Hybr.
Erythrina	L.	Korallenbaum .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
Christa galli . . .	L.	Hahnenkamm „	„	„	5—10	Brasilien
(Mycropterix „ „ .	Wlprs.)					
Escallonia	Mut.	Escallonie . . .	5, C. 1, O.	Saxifrageæ		
macrantha	Hook.	Grossblumige „	„	„	1—5	Chiloe, (Chile)
organensis	Gardn.	Orgel „	„	„	„	Orgelgebirge, [Brasilien
rubra	Pers.	Rothe „	„	„	„	Chile
Eupatorium . . .	L.	Wasserdost . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
glabratum	Kth.	Enthaarter „	„	„	5—10	Mexico
guatemalense . . .	Reg.	Guatemalischer „	„	„	„	Guatemala
Euphorbia	L.	Wolfsmilch . .	21, C. 1, O.	Euphorbiaceæ		
antiquorum	L.	Wahre „	„	„	10—15	Ost-Ind., Aegypt.
canariensis	L.	Canarische „	„	„	„	Canar. Inseln
pulchella	H. et B.	Schöne „	„	„	„	Madagaskar
Eutaxia	R. Br.	Eutaxie	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
myrtifolia	R. Br.	Myrtenblättrige „	„	„	1—5	Neu-Holland
Euthales.	R. Br.	Euthales . . .	5, C. 1, O.	Lobeliaceæ		
macrophylla . . .	Lindl.	Grossblättrige „	„	„	1—5	Neu-Holland
Evonymus	Theoph.	Spindelbaum. .	5, C. 1, O.	Rhamneæ		
japonicus fol. argent. varieg.	(Thb.)	Weissrandiger Japanischer „	„	„	1—5	Japan
„ fol. aureis maculatis	—	Goldgefleckter „ „	„	„	„	„
Fabiana	R. et P.	Fabiane	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
imbricata.	R. et P.	Dachziegelförm. „	„	„	1—5	Chile
Ficus	L.	Feigenbaum . .	21, C. 3, O.	Sycoideæ		
acuminata	Ham.	Langgespitzter „	„	„	10—15	Silhet, Ost-Ind.
Afzelii.	G. Don.	Afzel's „	„	„	„	Ost-Indien
barbata	Wall.	Bartiger „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Ficus						
bengalensis	L.	Bengalischer „	21, C. 3, O.	Sycoideæ	10—15	Ost-Indien
(Urostigma bengalense	Gasparr.)					
elastica	Roxb.	Elastischer „	„	„	„	„
(Urostigma elasticum	Miquel.)					
ferruginea	Desf.	Rostfarbiger „	„	„	„	Süd-Amerika
(Urostigma ferrugineum	Miqu.)					
fulva	Spreng.	Braunrother „	„	„	„	Brasilien
(Urostigma fulvum .	Miqu.)					
laurifolia	Lam.	Lorbeerblättrig. „	„	„	„	West-Indien
(Urostigma laurifolium	Miqu.)					
nitida	Thb.	Glänzender „	„	„	„	Ost-Indien
(Urostigma nitidum .	Miqu.)					
ovata	Vahl	Eiförmiger „	„	„	„	Guinea
(Urostigma ovatum .	Miqu.)					
pergamenea	Hort.	Pergamentartig. „	„	„	„	?
rubiginosa	Desf.	Rostfarbiger „	„	„	„	Cap
(australis	W.)				(5—10)	
(Urostig. rubiginosum	Gasparr.)					
stipulata	Thb.	Beblätterter „	„	„	10—15	China, Japan
Franciscea	Pohl.	Franciscea . .	14, C. 2, O.	Solanaceæ		
latifolia	Pohl.	Breitblättrige „	„	„	10—15	Brasilien
Frenela	Mirb.	Frenela	21, C. 8, O.	Coniferæ		
australis	Mirb.	Südliche „	„	„	1—5	Tasmannien, (Australien)
(Thuja „	Desf.)					
(Callitris „	R. Br.)					
Fuchsia	Plum.	Fuchsie	8, C. 1, O.	Onagrariæ		
corymbiflora . . .	R. et P.	Doldentraubige „	„	„	1—5	Peru
fulgens	Sesse	Leuchtende „	„	„	„	Mexico
globosa alba . . .	(Lindl.)	Weisse Kugelblüthige „	„	„	„	Hybr.
„ erecta . . .	Hort.	Aufrechte „ „	„	„	„	„
„ perfecta . .	Hend.	Vollkommene „ „	„	„	„	„
microphylla grandifl.	(Kth.)	Grossblumige kleinblättrige „	„	„	„	(Mexico)
miniata	Pl. et Lind.	Mennigrothe „	„	„	5—10	Neu-Granada
serratifolia multiflora	(R. et P.)	Gesägtblättrige „	„	„	1—5	(Peru)
syringæflora . . .	Hort.	Fliederblüthige „	„	„	5—10	Guatemala
hybrida Alpha. . .	Sm.	Anfang Bastard „	„	„	1—5	Hybr.
„ Beauty of Clapton	Batt.	Schönheit von Clapton „ „	„	„	„	„
„ „ „ Leeds .	Nicholl.	Shönh. v. Leeds „ „	„	„	„	„
hybr. belle Etoile .	Hort.	Schöne Stern „ „	„	„	„	„
„ Cassandra . . .	Ivery.	Cassandra „ „	„	„	„	„
„ Comte de Beaulieu	Salt.	Graf Beaulieu's „ „	„	„	„	„
„ Darling	Hend.	Lieblings „ „	„	„	„	„
„ Dr. Jephson . . .	Hally.	Dr. Jephson's „ „	„	„	„	„
„ Dutchess of Lancaster . . .	Stirz.	Herzogin von Lancaster „ „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Fuchsia						
„ elegantissima . .	Story.	Geschmack-vollste „ „	8, C. 1, O.	Onagrariæ	1—5	Hybride
„ Elisa Miellez . .	Miel.	Elise Miellez „ „	„	„	„	„
„ Esmeralda . . .	Miel.	Esmeralda „ „	„	„	„	„
„ exoniensis . . .	Paxt.	Geschmückte „ „	„	„	„	„
„ expansa	Sm.	Ausgebreitete „ „	„	„	„	„
„ Favourite. . . .	Veitch.	Lieblings „ „	„	„	„	„
„ formosa elegans .	Hort.	Schöne vortreff-liche „ „	„	„	„	„
„ Général Oudinot .	Hort.	Gen. Oudinot's „ „	„	„	„	„
„ Hendersonii . . .	Hend.	Henderson's „ „	„	„	„	„
„ Orion	Hort.	Orion „ „	„	„	„	„
„ Perl of England .	Hend.	Perle v. England „ „	„	„	„	„
„ pendula	Hend.	Hängende „ „	„	„	„	„
„ Pet	Hend.	Lieblings „ „	„	„	„	„
„ Premier	Hend.	Erste „ „	„	„	„	„
„ Prince Arthur . .	Nich.	Prinz Arthur's „ „	„	„	„	„
„ princeps	Pince.	Fürstliche „ „	„	„	„	„
„ Sidonia	Sm.	Sidonia's „ „	„	„	„	„
„ splendida	Wilm.	Schimmernde „ „	„	„	„	„
„ triumphans . . .	Hort.	Triumphirende „ „	„	„	„	„
Gazania	Gärt.	Gazanie	19, C. 3, O.	Compositæ		
rigens	R. Br.	Steifblättrige „	„	„	1—5	Cap
(Gorteria „	L.)					
Genista	L.	Ginster	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
alba	Lam.	Weisser „	„	„	1—5	Portugal, Nord-Afrika
(Spartium multiflorum	Ait.)					
bracteolata	Lk.	Deckblättriger „	„	„	„	Teneriffa
(Cytisus racemosus .	Hort.)					
„ superba . . .	Hort.	Stolzer „ „	„	„	„	Hybr.
Gesneria.	L.	Gesnerie. . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
Bethmanni	Ott. et Diet.	Bethmann's „	„	„	10—15	Hybr.
cardinalis	Lehm.	Vorzügliche „	„	„	„	Mittel-Amerika
(macrantha	Hort.)					
Cooperi	H. Wob.	Cooper's „	„	„	„	?
elliptica lutea . . .	(Hook.)	Gelbe elliptische „	„	„	„	(Neu-Granada)
faucialis	Lindl.	Weitschlundige „	„	„	„	Brasilien
Geroltiana	Kth.	Gerolt's „	„	„	„	Mexico
maculata	Moc. et Sesse.	Gefleckte „	„	„	„	„
rutila	Lindl.	Röthliche „	„	„	„	Brasilien
Suttoni	Lindl.	Sutton's „	„	„	„	„
zebrina splendens .	(Paxt.)	Glänzende zebra-streifige „	„	„	„	„
Gladiolus	Plin.	Siegwurz . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
Colvillii	Sweet.	Colvill's „	„	„	1—5	Hybr.
„ variet	—	„ Varietät „	„	„	„	„
floribundus	Jacqu.	Reichblüthige „	„	„	„	Cap
gandavensis . . .	Hort.	Genter „	„	„	„	Hybr.
natalensis	Reinw.	Natal'sche „	„	„	„	P. Natal
(psittacinus	Hook.)					
ramosus	Schneev.	Aestige „	„	„	„	Hybr.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Gloxinia.	Herit.	Gloxinie . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
caulescens	Lindl.	Stengeltragende „	„	„	10—15	Süd-Amerika
„ Cartonii	Hort.	Carton's „	„	„	„	Hybride
„ cœrulea grandiflora	Hort.	Grossbl. blaue „ „	„	„	„	„
„ Passinghamii. . .	H. Angl.	Passingham's „ „	„	„	„	„
„ rubra	Paxt.	Rothe „ „	„	„	„	„
„ „ maxima . . .	Hort.	Grosse rothe „ „	„	„	„	„
cerina	Hort.	Wachsgelbe „	„	„	„	„
digitaliflora	H. Berol.	Fingerhut-blüthige „	„	„	„	„
erecta Rex igneus .	Hort.	Aufrechte feuerrothe Königs „	„	„	„	„
Fyfiana	Hort.	Fyfian's „	„	„	„	„
hybrida	Hort.	Bastard „	„	„	„	„
Menziesii.	Young.	Menzie's „	„	„	„	Süd-Amerika
speciosa alba sanguinea	Hort.	Weiss-blutrothe-prächtige „	„	„	„	Hybride
„ bicolor maxima . .	Hort.	Grosse zweifarbige „ „	„	„	„	„
„ candida major . .	Hort.	Grosse weisse „ „	„	„	„	„
„ Comt. Therese Thun	Hort.	Gräfin Therese Thun's „ „	„	„	„	„
„ macrophylla varieg.	Hort.	Grossblättrige „ „	„	„	„	„
„ Teichleri	Hort.	Teichler's „ „	„	„	„	„
Goldfussia	Nees.	Goldfussie. . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
anisophylla	Nees.	Ungleichblättr. „	„	„	10—15	Ost-Indien
(Ruellia „	Wall.)					
isophylla	Nees.	Gleichblättrige „	„	„	„	„
(Ruellia „	Wall.)					
Goodia	Salisb.	Goodia	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
lotifolia	Salisb.	Schotenkleeblät. „	„	„	1—5	Neu-Holland
Grevillea	R. Br.	Grevillie . . .	4, C. 1, O.	Proteaceæ		
glabrata	Meisn.	Geglättete „	„	„	1—5	Neu-Holland
linearis	R. Br.	Linienblättrige „	„	„	„	„
robusta	Cunning.	Starke „	„	„	„	„
Thelemanni	Hüg.	Thelemann's „	„	„	„	„
Habrothamnus . .	Endl.	Prachtstrauch .	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
aurantiacus	Regel.	Orangenfarbiger „	„	„	5—10	Guatemala
corymbosus	Endl.	Doldentraubiger „	„	„	„	Mexico
cyaneus	Lindl.	Blaublühender „	„	„	„	„
(Jochroma tubulosa .	Benth.)					
elegans	Brong.	Zierlicher „	„	„	„	„
„ fol. varieg. .	—	Bunter „ „	„	„	„	
fasciculatus	Endl.	Büschelartiger „	„	„	„	„
Hügelii	Hort.	Hügel's „	„	„	„	?
magnificus	Hort.	Prächtiger „	„	„	„	?
Hakea	Schrad.	Hakea.	4, C. 1, O.	Proteaceæ		
Baxteri	R. Br.	Baxter's „	„	„	1—5	Neu-Holland
Hardenbergia . .	Benth.	Hardenbergie .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
longiracemosa . . .	Lindl.	Langtraubige „	„	„	1—5	Neu-Holland
monophylla	Benth.	Einblättrige „	„	„	„	„
ovata	Benth.	Eirunde „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Hebeclinium . . .	D. C.	Hebeclinium . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
janthinum	Hook.	Violettes „	„	„	10—15	St. Catharina, Brasilien
Hedychium. . . .	König.	Kranzblume . .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
Gardnerianum . . .	Rosc.	Gardner's „	„	„	10—15	Ost-Indien
Helianthemum . .	Val.& Cord.	Sonnenröschen.	13, C. 1, O.	Cistineæ		
algarviense	Dun.	Algarvisches „	„	„	1—5	Süd-Portugal
Heliconia	L.	Heliconie . . .	5, C. 1, O.	Musaceæ		
angustifolia	Hook.	Schmalblättrige „	„	„	10—15	Brasilien
Heliotropium. . .	Theoph.	Sonnenwende .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
corymbosum novum.	Hort.	Neue doldentraubige „	„	„	5—10	Hybr.
peruvianum	L.	Peruanische „	„	„	„	Peru, Chile
„ Triomph de Liège.	Hort.	Triumph von Lüttich „ „	„	„	„	Hybr.
„ Voltairianum . . .	Hort.	Voltair's „ „	„	„	„	„
„ „ nanum . . .	Hort.	„ Zwerg „ „	„	„	„	„
Helipterum. . . .	D. C.	Sonnenflügel .	19, C. 1, O.	Compositæ		
humile.	D. C.	Niedriger „	„	„	5—10	Cap
(Aphelexis „	Don.)					
Hemimeris	L. Fil.	Halbblume . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
urticæfolia nana . .	(W.)	Niedrige nesselblättrige	„	„	1—5	(S.-Amer., Peru)
[Alonsoa „ „	(Ait.)]					
Hermannia	Tourn.	Hermannie. . .	16, C. 3, O.	Büttneriaceæ		
plicata	W.	Faltige „	„	„	1—5	Cap
Hibbertia	Andr.	Hibbertie . . .	13, C. 3, O.	Dilleniaceæ		
volubilis	Andr.	Windende „	„	„	1—5	Neu-Holland
Hibiscus	Diosc.	Eibisch	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
Cameroni fulgens. .	Rollison	Leucht. Cameron's „	„	„	10—15	Hybr.
Rosa sinensis . . .	L.	Chinesischer „	„	„	„	China, Ost-Ind.
„ „ atrorubro pl.. .	Hort.	Gef. schwarzrother „ „	„	„	„	
„ „ Parkeri. . . .	Hort.	Parker's „ „	„	„	„	Hybr.
Hoya	R. Br.	Hoya	5, C. 2, O.	Asclepiadeæ		
bella	Hook.	Schöne „	„	„	10—15	Java
carnosa	R. Br.	Fleischige „	„	„	„	Ost-Indien
Hydrangëa. . . .	Cronow.	Wasserstrauch.	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
hortensis	Sm.	Hortensien „	„	„	1—5	China, Japan
Hypericum. . . .	Diosc.	Hartheu	18, C. 4, O.	Hypericineæ		
floribundum . . .	Ait.	Vielblumiges „	„	„	1—5	Canar. Inseln
Hypocalyptus . .	Thb.	Hypocalyptus .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
obcordatus	Thb.	Verkehrtherzförmige „	„	„	5—10	Cap
Hypocyrta	Mart.	Hypocyrta. . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
scabrida	Lem.	Schärflige „	„	„	10—15	Süd-Amerika
Jambosa.	D. C.	Jambosa. . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
australis	D. C.	Südliche „	„	„	1—5	Neu-Holland (Australien)
Jasminum	Dodon.	Jasmin	2, C. 1, O.	Jasmineæ		
gracile	Andr.	Schlanker „	„	„	5—10	Norfolk-Inseln,
nudiflorum	Lindl.	Nacktblumiger „	„	„	1—5	Nord-China
odoratissimum . . .	L.	Wohlriechenster „	„	„	„	Madeira
Sambac	Ait.	Arabischer „	„	„	10—15	Ost-Indien
Ilex	Lonic.	Hülse	4, C. 4, O.	Celastrineæ		
latifolia	Thb.	Breitblättrige „	„	„	1—5	Japan

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Indigofera	L.	Indigo	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
australis	W.	Südlicher „	„	„	1—5	Neu-Holland
verrucosa	Wall.	Warziger „	„	„	„	Ost-Indien ?
Jubaea	Humb.	Mähnenpalme .	13, C. 3, O.	Palmæ		
spectabilis	Humb.	Ansehnliche „	„	„	10—15	Chile
Juniperus	L.	Wachholder . .	22, C. 13, O.	Coniferæ		
chinensis	L.	Chinesischer „	„	„	1—5	China, Japan
flaccida	Schlecht.	Schlaffer „	„	„	„	Mexico
macrocarpa	Sibth.	Grossfrüchtiger „	„	„	„	Griechenland
pendula	Hort.	Hängender „	„	„	„	Kaukasus
Justicia	Houst.	Justicie	2, C. 1, O.	Personatæ		
calycotricha . . , .	Lk.	Kelchhaarige „	„	„	10—15	Brasilien
(Schaueria „	Nees.)					
carnea	Lindl.	Fleischfarbige „	„	„	„	„
(Cyrtanthera magnifica	Nees.)					
speciosa	Roxb.	Prächtige „	„	„	„	Ost-Indien
(Peristrophe „	Nees.)					
velutina	Brong.	Sammetartige „	„	„	„	?
(carnea superba . .	Hort.)					
Kalosanthes . . .	Haw.	Schönblume . .	5, C. 5, O.	Crassulaceæ		
coccinea	Haw.	Scharlachrothe „	„	„	5—10	Cap
(Crassula „	L.)					
„ grandiflora miniata	Hort.	Mennigrothe „ „	„	„	„	Hybr.
„ nitida	Hort.	Glänzende „ „	„	„	„	„
„ superba	Hort.	Stolze „ „	„	„	„	„
versicolor	Haw.	Verschiedenfarb. „	„	„	„	Cap
(Crassula „ . . .	Burch.)					
Kennedya	Vent.	Kennedye . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
Comptoniana . . .	Lk.	Compton's „	„	„	1—5	Neu-Holland
Lachenalia	Jacq.	Lachenalie . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
pendula	Ait.	Hängende „	„	„	1—5	Cap
tricolor	Thb.	Dreifarbige „	„	„	„	„
Lantana	L.	Lantana	14, C. 2, O.	Verbenaceæ		
formosa	Hort.	Schöne „	„	„	10—15	Hybr.
involucrata	L.	Eingehüllte „	„	„	„	Süd-Amerika
multiflora	Hort.	Vielblumige „	„	„	„	West-Indien
purpurea	Hort.	Purpurrothe „	„	„	„	Hybr.
spectabilis	Hort.	Ansehnliche „	„	„	„	„
Latania	Commers.	Latanie	22, C. 13, O.	Palmæ		
borbonica	Lam.	Bourbonische „	„	„	10—15	Insel Bourbon
(Livistonia chinensis .	Mart.)					
Laurus	Plin.	Lorbeer	9, C. 1, O.	Laurineæ		
nobilis	L.	Edler „	„	„	1—5	Süd-Europ., Ital.
Leschenaultia . .	R. Br.	Leschenaultie .	5, C. 1, O.	Lobeliaceæ		
formosa	R. Br.	Schöne „	„	„	5—10	Neu-Holland
Leptospermum . .	Forst.	Zartsame . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
scoparium floribundum	(Forst.)	Vollblumiger besenartiger „	„	„	1—5	Neu-Holland
Libocedrus	Endl.	Tropfceder . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
chilensis	Endl.	Chilesische „	„	„	1—5	Chile
(Thuja „	Don.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Lilium	Virg.	Lilie	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
lancifolium album. .	Thb.	Weisse lanzettblättrige „	„	„	1—5	Japan
„ rubrum . .	Thb.	Rothe „ „	„	„	„	„
longiflorum	Thb.	Langblumige „	„	„	„	„
Linum	Plin.	Flachs	5, C. 1, O.	Linoideæ		
flavum	L.	Gelber „	„	„	1—5	Süd-Europa, (S.-Deutschland)
Lippia	L.	Lippie	14, C. 2, O.	Verbenaceæ		
citriodora	Kth.	Citronen riech. „	„	„	1—5	Chile, Peru
(Aloysia „	Pers.)					
Lobelia	L.	Lobelie	5, C. 1, O.	Lobeliaceæ		
fulgens pyramidalis .	Bell.	Pyramidenförm. leuchtende „	„	„	1—5	Hybr. (Mexico)
ignea Queen Victoria	Hort.	Königin Victoria's feurige „	„	„	„	Hybride
Lophospermum . .	D. Don.	Kammsame . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
erubescens	D. Don.	Röthlicher „	„	„	1—5	Mexico
Magnolia.	Plum.	Magnolie . . .	13, C. 6, O.	Magnoliaceæ		
fuscata	Andr.	Bräunliche „	„	„	1—5	China
grandiflora	L.	Grossblumige „	„	„	„	Florida, Carolina
Mahernia	L.	Mahernie . . .	16, C. 3, O.	Büttneriaceæ		
glabrata	Cav.	Glatte „	„	„	1—5	Cap
hybr. Hector . . .	Hort.	Hektor's Bastard „	„	„	„	Hybr.
Malva	Plin.	Malve	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
virgata	Cav.	Ruthenförmige „	„	„	1—5	Cap
Maranta	Plum.	Maranta	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
Selloi	Warsc.	Sello's „	„	„	10—15	Guatemala?
setosa	A. Diet.	Borstige „	„	„	„	Brasilien
(Phrynium „	Rosc.)					
zebrina	Sims.	Zebra „	„	„	„	„
(Calathea „	Lindl.)					
Maurandia	Orteg.	Maurandie. . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
Barclayana	Lindl.	Barclay's „	„	„	1—5	Mexico
semperflorens . . .	Orteg.	Immerblühende „	„	„	„	„
Melaleuca	L.	Cajaputbaum .	18, C. 3, O.	Myrtaceæ		
armillaris	Sm.	Ringförmiger „	„	„	1—5	Neu-Holland
ericæfolia	Sm.	Heideblättriger „	„	„	„	„
erubescens	Ott.	Erröthender „	„	„	„	„
fulgens	R. Br.	Glänzender „	„	„	„	„
hypericifolia . . .	Sm.	Hartheublättr. „	„	„	„	„
imbricata.	Lk.	Dachziegeliger „	„	„	„	„
lateritia	Ott. et Diet.	Ziegelrother „	„	„	„	„
linarifolia	Sm.	Leinkrautblättr. „	„	„	„	„
propinqua	Schr.	Verwandter „	„	„	„	„
pulchella	R. Br.	Zierlicher „	„	„	„	„
rhaphiophylla . . .	Schr.	Spindelblättrig. „	„	„	„	„
squamea	Labill.	Schuppiger „	„	„	„	„
thymifolia	Sm.	Thymianblättrig. „	„	„	„	„
virgata	Hort.	Ruthenförmiger „	„	„	„	„
Mesembrianthemum	Dill.	Mittagblume (Zaserblume)	12, C. 5, O.	Mesembrinæ		
bicolorum	L.	Zweifarbige „	„	„	1—5	Cap

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Mesembrianthemum						
spectabile	Haw.	Ansehnliche „	12, C. 5, O.	Mesembrinæ	1—5	Cap
violaceum	D. C.	Violette „	„	„	„	„
Metrosideros. . .	Gärt.	Eisenmass . . .	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
buxifolia	A. Cunning.	Buxbaumblättr. „	„	„	1—5	Neu-Seeland
florida.	Sm.	Vollblumiges „	„	„	„	„
(Myrtus robusta . .	Hort.)					
villosa.	Sm.	Zottiges „	„	„	„	Sandwich-Inseln
Mimulus	L.	Gauklerblume .	14, C. 2, O.	Personatæ		
hybridus Columbus .	Hort.	Columbus Bastard	„	„	1—5	Hybr.
„ punctatus .	Hort.	Punctirte „ „	„	„	„	„
„ rubinus . .	Hort.	Rubinrothe „ „	„	„	„	„
Mitraria	Cav.	Mützenblume .	14, C. 2, O.	Personatæ		
coccinea	Cav.	Scharlachrothe „	„	„	5—10	Chile, Brasilien
Myosotis.	Diosc.	Mauseohr . . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
azorica	Watson.	Azorisches „	„	„	1—5	Azorische Inseln
Myrica.	L.	Gagel	22, C. 4, O.	Amentaceæ		
laciniata	W.	Geschlitztblättr. „	„	„	1—5	Cap
Myrtus	Cato.	Myrte	12, C. 1, O.	Myrtaceæ		
communis	L.	Gemeine „	„	„	1—5	Süd-Europa
„ involuta . .	—	Eingerollte „ „	„	„	„	
„ macrophylla .	—	Grossblättrige „ „	„	„	„	
„ „ fl. pl. .	—	Gefüllte „ „ „	„	„	„	
Nematanthus. . .	Schrad.	Fadenblume . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
Guillemini	Brong.	Guillemin's „	„	„	10—15	Brasilien
jonêma	Mart.	Violette „	„	„	„	„
(Morelianus	Hort.)					
longipes	D. C.	Langstielige „	„	„	„	„
Nerium	Diosc.	Oleander . . .	5, C. 1, O.	Apocyneæ		
Oleander	L.	Gemeiner „	„	„	1—5	Süd-Europa
„ fl. albo	Hort.	Weissblühend. „ „	„	„	„	Hybr.
„ fl. atropurpureo .	„	Schwarzrother „ „	„	„	„	„
„ fl. carnea pl. . .	„	Gef. fleischfarb. „ „	„	„	„	„
„ cupreum . . .	„	Kupferrother „ „	„	„	„	„
„ fl. flavo . . .	„	Gelbblühender „ „	„	„	„	„
„ Foscolumbianum	„	Foscolumbi's „ „	„	„	„	„
„ fl. striato . . .	„	Gestreiftblum. „ „	„	„	„	„
„ splendens . . .	„	Glänzender „ „	„	„	„	„
„ vittatum fl. pl. .	„	Gef. band-streifiger „ „	„	„	„	„
Olea.	Var. Cat.	Oelbaum. . . .	2, C. 1, O.	Oleineæ		
fragrans major . .	Thb.	Grosser duftend. „	„	„	1—5	Japan, China
Oxalis	L.	Sauerklee . . .	10, C. 5, O.	Oxalideæ		
Bowiei	Bot. Reg.	Bowie's „	„	„	1—5	Cap, Mexico
carnosa	Molin.	Fleischiger „	„	„	„	Chile
elegans	H. B. et Kth.	Schöner „	„	„	„	Columbien, Peru
floribunda	Lehm.	Vielblumiger „	„	„	5—10	Brasilien
Pancratium . . .	Dalech.	Trichterlilie . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
caribæum	L.	Caribäische „	„	„	10—15	West-Indien
(Hymenocallis „	Herb.)					
speciosum	Salisb.	Prächtige „	„	„	„	„
(Hymenocallis „	Herb.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Pândanus	L. Fil.	Pândanus, (Schraubenbaum)	22, C. 1, O.	Pandaneæ		
graminifolius . . .	Hort.	Grasblättriger „	„	„	10—15	Java ?
javanicus fol. varieg.	Hort.	Bunt. Javanisch. „	„	„	„	„
odoratissimus . . .	L. Fil.	Wohlriechendst. „	„	„	„	Ost-Indien
Panicum	Plin.	Hirse	3, C. 2, O.	Gramineæ		
plicatum	Lam.	Gefaltene „	„	„	10—15	Ost-Indien
Passerina	L.	Vogelkopf. . .	8, C. 1, O.	Thymeleæ		
filiformis	L.	Fadenförmiger „	„	„	1—5	Cap
Passiflora	Fr. Caes.	Passionsblume.	16, C. 3, O.	Passifloreæ		
alato-cœrulea . . .	Lindl.	Geflügelte blaue „	„	„	10—15	Hybr.
cœrulea	L.	Blaue „	„	„	1—5	Peru, Brasilien
cœruleo-racemosa .	Sab.	Blautraubige „	„	„	„	Hybr.
Pelargonium . . .	Herit.	Storchschnabel.	16, C. 4, O.	Geraniaceæ		
Ada	Hills.	Ada's „	„	„	1—5	Hybr. (S.-Afrika)
Admirable	Gain.	Bewunderungsw. „	„	„	„	„
albidum	—	Weisslicher „	„	„	„	„
Alonzo	Fost.	Alfon's „	„	„	„	„
Amazone.	—	Amazonen „	„	„	„	„
Anais	Chauw.	Anai's „	„	„	„	„
Ariadne	Fost.	Ariadne's „	„	„	„	„
Ariel	Fost.	Ariel's „	„	„	„	„
Attraction	Story.	Reizender „	„	„	„	„
Beauty of Ware . .	Gain.	Schönh. v. Ware „	„	„	„	„
Boule de neige . .	—	Schneekugel „	„	„	„	„
Bride of Abydos . .	Wood.	Braut v. Abydos „	„	„	„	„
Camilla	Bainb.	Camilla's „	„	„	„	„
Castor.	Catl.	Castor's „	„	„	„	„
Celia	Hoyle.	Celia's „	„	„	„	„
Cerise Unique . . .	—	Einz. Kirschroth. „	„	„	„	„
Charles Domage . .	—	Carl Domage's „	„	„	„	„
Collin	—	Collin's „	„	„	„	„
Colonel of the Buffs	Hoyle.	Oberster von den Schlägern „	„	„	„	„
conspicuum	Fost.	Ansehnlicher „	„	„	„	„
Cooperi	—	Cooper's „	„	„	„	„
Darius	Rouse.	Darius „	„	„	„	„
discolor	—	Verschiedenfarb. „	„	„	„	„
elegans	Topp.	Schöner „	„	„	„	„
Exquisite	Bragg.	Auserlesener „	„	„	„	„
Extravaganza . . .	Hend.	Abweichender „	„	„	„	„
Fireball	Hend.	Feuerkugel „	„	„	„	„
Flavia.	Hoyle.	Flavia „	„	„	„	„
Flying Dutchmann .	Turner.	Flieg. Holländer „	„	„	„	„
Forget me not. . .	Lyne.	Vergissmeinnicht „	„	„	„	„
Ganymede	Hoyle.	Ganymeda's „	„	„	„	„
Generalissimo . . .	Hoyle.	General „	„	„	„	„
Hercules	Eyre.	Riesen „	„	„	„	„
Hero of Surrey . .	Gain.	Held von Surrey „	„	„	„	„
Jehu superb . . .	Chauv.	Prächt. verwegn. „	„	„	„	„
Jenny Lind	Fost.	Jenny Lind's „	„	„	„	„
Isabella	Beck.	Isabella's „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Pelargonium						
Jullien	Bragg.	Jullien's „	16, C. 4, O.	Geraniaceæ	1—5	Hybr.
Kulla	Hoyle.	Kulla's „	„	„	„	„
Lady Rivers . . .	Gain.	Frau Rivers „	„	„	„	„
Leonora	Beck.	Leonora's „	„	„	„	„
Lord Mayor . . .	Black.	Lord Mayor's „	„	„	„	„
Magnet	Hoyle.	Magnet „	„	„	„	„
May Queen	Hoy.	Mai-Königin „	„	„	„	„
Miss Herbert . . .	—	Fräul. Herbert's „	„	„	„	„
Mochanna	Hoyle.	Mochanna's „	„	„	„	„
Mogul	Gain.	Mogul „	„	„	„	„
Nectar Cup	Hoyle.	Nectar-Schale „	„	„	„	„
Nepaulese Prince. .	Bragg.	Nepalscher Prinz „	„	„	„	„
New Colour . . .	Hend.	Neufarbiger „	„	„	„	„
Norah	Fost.	Norah's „	„	„	„	„
ocellatum	Hoy.	Augen „	„	„	„	„
Orion	Fost.	Orion „	„	„	„	„
Painted Lady . . .	Fost.	Schminkfrau „	„	„	„	„
Painter Improved .	Beck.	Verbess. Maler „	„	„	„	„
Paragon	Fost.	Muster „	„	„	„	„
Pearl.	Drury.	Perl „	„	„	„	„
Perfection	Dennis.	Vollkommener „	„	„	„	„
Pericles	Fost.	Perikles „	„	„	„	„
Pink perfection . .	—	Vollkom. Nelken „	„	„	„	„
Pretender	Thur.	Prätendent „	„	„	„	„
Princess.	Beck.	Prinzess „	„	„	„	„
„ Alice	Ingram.	„ Alicen's „	„	„	„	„
Priory Queen . . .	Pince.	Priorei-Königin „	„	„	„	„
Psyche	—	Psychen's „	„	„	„	„
Queen of Bourbon .	—	Kön. v. Bourbon „	„	„	„	„
Rising Sun	Gain.	Sonnenaufgang „	„	„	„	„
Rosamond	Beck.	Rosamond „	„	„	„	„
Rouseanum	—	Rouse's „	„	„	„	„
Rubens	Fost.	Rother „	„	„	„	„
Salamander	Gain.	Salamander „	„	„	„	„
Sidonia	—	Sidonia's „	„	„	„	„
Terpsichore	Hoyle.	Terpsichoren's „	„	„	„	„
Tom Thumb . . .	—	Däumling „	„	„	„	„
Trafalgar	Gain.	Trafalgar „	„	„	„	„
Triomphe de Montrouge	—	Mont-rouge-Triumph „	„	„	„	„
Tyrian Queen . . .	Beck.	Tyrian Königin „	„	„	„	„
Unique	Hoyle.	Einziger „	„	„	„	„
Virgin Queen . . .	Arn.	Jungfr. Königin „	„	„	„	„
Wels scarlet . . .	—	Wels scharlach „	„	„	„	„
Ytolinski.	Chauv.	Ytolinski's „	„	„	„	„
Zenobia	Beck.	Zenobia's „	„	„	„	„
Peliosanthes . . .	Andr.	Bleichblume. .	6, C. 1, O.	Smilacineæ		
Teta	Andr.	Teta „	„	„	10—15	Ost-Indien
Pentastemon . . .	Mich.	Bartfaden . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
argutus	Paxt.	Scharfer „	„	„	1—5	Mexico, Texas
barbatus	Don.	Bartiger „	„	„	„	Mexico

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Pentastemon						
Hartwegii	Benth.	Hartweg's „	14, C. 2, O.	Personatæ	1—5	Mexico
Pernettya	Gaud.	Pernettye . . .	10, C. 1, O.	Ericeæ		
mucronata	Gaud.	Stachelspitzige „	„	„	1—5	Mittel-Amerika
phillyreæfolia . . .	D. C.	Steinlindenblätt. „	„	„	„	„
? Persêa	Gärt.	Persêa	9, C. 1, O.	Laurineæ		
nutans	Nees.	Ueberhängende „	„	„	10—15	West-Indien
(Laurus Leucoxylon .	W.)					
Petunia	Juss.	Petunie	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
violacea hybr.. . .	(Hook.)					(Chile)
Beauté parfait. . .	—	Vollkom.Schönh. „	„	„	1—5	Hybr.
„ crimson King . .	Young.	Carmoisinrothe „	„	„	„	„
„ Enchantress . . .	—	Zauberin „	„	„	„	„
„ membranacea . .	—	Häutige „	„	„	„	„
„ striata	Sm.	Gestreifte „	„	„	„	„
Phajus	Lour.	Phajus	20, C. 1, O.	Orchideæ		
grandifolius	Lour.	Grossblättriger „	„	„	10—15	China
(Bletia Tankervilliæ.	R. Br.)					
Philodendron . .	Schott.	Baumfreund . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
pertusum.	Kth.	Durchstossener „	„	„	10—15	Mittel-Amerika
(Scindapsus „	Schott.)					
pinnatifidum . . .	Schott.	Halbgefiederter „	„	„	„	Caracas
(Caladium „	W.)					
Phoenix	Theoph.	Dattelpalme . .	6, C. 3, O.	Palmæ		
dactylifera	L.	Gefingerte „	„	„	10—15	Arab., N.-Afrika
Phormium	Forst.	Flachslilie . .	22, C. 6, O.	Asphodeleæ		
tenax	Thb.	Zähe „	„	„	1—5	Neu-Seeland
Phylica	L.	Phylica	5, C. 1, O.	Rhamneæ		
ericoides	L.	Heideartige „	„	„	1—5	Cap
Phyllanthus . . .	L.	Blattblume . .	21, C. 8, O.	Euphorbiaceæ		
angustifolius . . .	Sw.	Schmalblättrige „	„	„	10—15	Jamaika
Pimelia	Banks. et Sol.	Glanzstrauch .	2, C. 1, O.	Thymeleæ		
decussata	R. Br.	Kreuzblättriger „	„	„	1—5	Neu-Holland
diosmæfolia	Lodd.	Duftstrauchblät. „	„	„	„	„
Hendersonii	Hook.	Henderson's „	„	„	„	„
Pinus	L.	Kiefer.	21, C. 1, O.	Coniferæ		
palustris	Ait.	Sumpfliebende „	„	„	1—5	Carolin., Florida
Pitcairnia	Herit.	Pitcairnie . . .	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
bromeliæfolia . . .	Herit.	Ananasblättrige „	„	„	10—15	Jamaika
flammea	Lindl.	Flammende „	„	„	„	Brasilien
furfuracea	Bot. Mag.	Kleienartige „	„	„	„	Süd-Amerika
integrifolia	Gawl.	Ganzblättrige „	„	„	„	Ost-Indien
muscosa	Mart.	Bemooste „	„	„	„	Brasilien
Olfersi	Lk.	Olfer's „	„	„	„	„
punicea	Scheidw.	Dunkelrothe „	„	„	„	„
ramosa	Jacq.	Aestige „	„	„	„	Süd-Amerika
staminea	Lodd.	Langfädige „	„	„	„	„
Pittosporum . . .	Banks.	Klebsame . . .	5, C. 1, O.	Pittosporeæ		
Tobira	Ait.	Chinesischer „	„	„	1—5	China, Japan
undulatum	Andr.	Wellenblättriger „	„	„	„	Neu-Holland
Plumbago	L.	Bleiwurz . . .	5, C. 1, O.	Plumbagineæ		
capensis	Thb.	Capische „	„	„	1—5	Cap

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Polygala	Diosc.	Kreuzblume . .	17, C. 5, O.	Polygaleæ		
grandiflora	Lodd.	Grossblumige „	„	„	1—5	Cap
myrtifolia	L.	Myrtenblättrige „	„	„	„	„
oppositifolia . . .	L.	Paarblättrige „	„	„	„	„
Polypodium . . .	L.	Tüpfelfarren .	24, C. 1, S.	Filices		
aureum	L.	Goldfarbiger „	„	„	10—15	West-Indien
Primula	Matth.	Primel	5, C. 1, O.	Primulaceæ		
acaulis alba pl. . .	All.	Weissgefüllte stengellose „	„	„	1—5	(Mittel-Europa)
„ fulgens pl. . . .	Hort.	Gef. leuchtende „	„	„	„	
„ lilacina pl. . . .	„	Gef. lilafarbene „	„	„	„	
„ lutea pl.	„	Gef. gelbe „	„	„	„	
„ variegata pl. . .	„	Gef. bunte „	„	„	„	
praenitens	Ker.	Chinesische „	„	„	5—10	China
„ fl. albo . .	—	Weisse „ „	„	„	„	
Punica	Caesal.	Granatbaum . .	12, C. 1, O.	Granateæ		
nana	L.	Zwerg „	„	„	5—10	Antillen
Puya	Molin.	Puya	6, C. 1, O.	Bromeliaceæ		
Altensteinii	H. Berol.	Altenstein's „		„	10—15	Cordill. (Columb.)
Pyrethrum	Gärt.	Bertramwurz .	19, C. 2, O.	Compositæ		
Parthenium fl. pl. .	Sm.	Gef. Mutterkraut „	„	„	1—5	(Deutschland)
sinense fl. pl. variet.	Sabin.	Gef. chinesische „	„	„	„	China
(Chrysanthemum indicum	Thb.)					
(Anthemis artemisiæfolia	W.)					
Ramondia	Rich.	Ramondie . . .	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
pyrenaica	Rich.	Pyrenäische „	„	„	1—5	Pyrenäen
Remusatia	Endl.	Remusatie. . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
vivipara	Schott.	Lebendig gebär. „	„	„	10—15	Malabar, Nepal
(Arum „	Roxb.)					
Rêtama	Boiss.	Rêtama	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
monosperma . . .	Boiss.	Einsamige „	„	„	1—5	Sicilien, Spanien
(Genista „	Lam.)					
(Cytisus filipes . .	Hort.)					
Retinispora . . .	Sieb. et Zucc.	Harzsame . . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
ericoides	Hort.	Heideartiger „	„	„	1—5	?
squarrosa	Sieb. et Zucc.	Sparriger „	„	„	„	Japan
Rhapis	L. Fil.	Rhapis (Ruthenpalme) .	23, C. 2, O.	Palmæ		
flabelliformis . . .	Ait.	Fächerförmige „	„	„	5—10	China, Japan
Rhododendron . .	L.	Alpenrose . . .	10, C. 1, O.	Rhodoreæ		
arboreum altaclarense triumphans . .	(Sm.)	Triumphirende baumartige „	„	„	1—5	(Nepal) Hybr.
„ amabile	Hort.	Liebliche „ „	„	„	„	„
„ coccineum . . .	„	Scharlachrothe „ „	„	„	„	„
„ Cunninghamii . .	„	Cunningham's „ „	„	„	„	„
„ „ album . .	„	„ weisse „ „	„	„	„	„
„ grandissimum superbum. . . .	„	Prächtige grossblumige „ „	„	„	„	„
„ punctatum . . .	„	Punctirte „ „	„	„	„	„
„ Reichenbachianum.	„	Reichenbach's „ „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Rhododendron						
Russelianum . . .	Hort.	Russel's „ „	10, C. 1, O.	Rhodoreæ	1—5	(Nepal) Hybr.
Smithii	Sweet.	Smith's „ „	„	„	„	„
„ album . . .	—	„ weisse „ „	„	„	„	„
„ argenteum. .	—	„ silberblät. „ „	„	„	„	„
spectabile	Hort.	Ansehnliche „ „	„	„	„	„
superbissimum. . .	„	Prächtigste „ „	„	„	„	„
hybridum	Hook.	Bastard „	„	„	„	„
indicum barbatum . (Azalea indica. . .	(Sweet.) L.)	Bart. indische „ „	„	„	5—10	(Ost-Ind.) Hybr.
Baron von Hügel .	Hort.	Bar. v. Hügel's „ „	„	„	„	„
Danielsianum . . .	Hort.	Daniel's „ „	„	„	„	„
decorum	Knight.	Geschmückte „ „	„	„	„	„
elatum pl.	Sweet.	Gefüllte hohe „ „	„	„	„	„
exquisite	Knight.	Auserlesene „ „	„	„	„	„
lateritium grandiflor. .	Hort.	Grossblumige ziegelrothe„ „	„	„	„	„
magniflorum . . .	Hort.	Grossblumige „ „	„	„	„	„
mirabilis	Hort.	Röthlichweisse„ „	„	„	„	„
optimum	Hort.	Gute „ „	„	„	„	Hybr.
phœniceum	Hort.	Dunkelrothe „ „	„	„	„	H.-Kong, China
Prima Donna , . .	Knight.	Erste Schöne „ „	„	„	„	Hybr.
Prince Albert . . .	„	Prinz Albert's „ „	„	„	„	„
variegatum	Hort.	Bunte „ „	„	„	„	„
ledifolium leucanthum (Azalea indica alba .	D. C. Hort.)	Weissblumige porstblättrige „	„	„	„	China
obtusum	Lindl.	Stumpfe „	„	„	1—5	„
Rhynchospermum .	Lindl.	Schnabelsame .	5, C. 1, O.	Apocyneæ		
jasminoides	Lindl.	Jasminartiger „	„		5—10	Shanghai, China
Richardia	Kth.	Richardie . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
africana . . . . . (Calla aethiopica . .	Kth. L.)	Afrikanische „	„	„	5—10	Afrika
Rôchea	D. C.	Rôchea	5, C. 5, O.	Crassulaceæ		
falcata minor . . . (Crassula „	D. C. W.)	Kleine Sichelblät.„	„	„	5—10	Cap
Rosa	Varr.	Rose	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
indica burbonica	—	Bourbon „	„	„		(Insel Bourbon)
Acidalie	Hort.	Acidalien's ind. „	„	„	1—5	Hybr.
Bouquet de Flore .	Hort.	Flora's Strauss „ „	„	„	„	„
Charles Souchet .	Hort.	Carl Souchet's „ „	„	„	„	„
Comice de Seine et Marne . . .	Hort.	Comitée der Seine und Marne „ „	„	„	„	„
Comte de Rambuteau . . .	Souch.	Graf von Rambuteau's „ „	„	„	„	„
Cythere	Hort.	Cytheren's „ „	„	„	„	„
Dupetit Thouars .	Hort.	Dupet.Thouars'„ „	„	„	„	„
Edouard Desfossé .	Hort.	Ed. Desfosse's „ „	„	„	„	„
Emile Courtier . .	Hort.	Em. Courtier's „ „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Rosa indica bourbonica						
Georges Cuvier . .	Hort.	Georg Cuvier's „ „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	1—5	Hybr.
Gloire de Paris . .	Hort.	Ruhm v. Paris „ „	„	„	„	„
Gracieuse	Hort.	Liebreiche „ „	„	„	„	„
Hennequin	Hort.	Hennequin's „ „	„	„	„	„
Henri Lecoq . . .	Hort.	Heinr. Lecoq's „ „	„	„	„	„
Hermosa	Hort.	Hermosa „ „	„	„	„	„
Julie de Fontenelle .	Portem.	Julie von Fontenelles „ „	„	„	„	„
Jupiter	Verd.	Jupiter's „ „	„	„	„	„
Justine	Rouss.	Justinen's „ „	„	„	„	„
Louise Odier . . .	Margott.	Louise Odier's „ „	„	„	„	„
Mad. Angelina . .	Chanet.	Fr. Angelina's „ „	„	„	„	„
„ Desprez . . .	Hort.	„ Desprez „ „	„	„	„	„
„ Nérard . . .	Hort.	„ Nérard's „ „	„	„	„	„
„ Souchet . . .	Souch.	„ Souchet's „ „	„	„	„	„
Marianne	Hort.	Mariannen's „ „	„	„	„	„
Marquis de Moyria .	Lachar.	Marqu. v. Moyr. „ „	„	„	„	„
Menoux	Hort.	Menoux' „ „	„	„	„	„
Mrs. Bosanquet . .	„	M. Bosanquet's „ „	„	„	„	„
Ninon de l'Enclos . .	„	Anna v. l'Enclo's „ „	„	„	„	„
Paul Josèphe . . .	„	Paul Josèphe's „ „	„	„	„	„
Pauline Leclerc . .	„	Paul. Leclerc's „ „	„	„	„	„
Phoenix	„	Phoenix „ „	„	„	„	„
Pompon cramoisi . .	„	Kermesin geschmückte „ „	„	„	„	„
Premices des Charpennes	„	Erstling von Charpennes „ „	„	„	„	„
Pucelle Genevoise .	„	Genfer Jungfr. „ „	„	„	„	„
Reine des isle Bourbon	„	Königin der „ „	„	„	„	„
Reine de Vierges .	„	Kön. der Jungfr. „ „	„	„	„	„
Souchet	„	Souchet's „ „	„	„	„	„
Souvenir de la Malmaison	Beluz.	Erinnerung von Malmaison „ „	„	„	„	„
ind. Lawrenceana fl. pl.	Swelf.	Gef. Lawrence „	„	„	„	„
Kermesina pl. . . .	Hort.	Gef. Kermesin „ „	„	„	„	„
ind. Noisettiana Amé Vibert	Hort.	Vibert's liebe Noisette „	„	„	„	„
Charles X.	Hort.	Carl's X. „ „	„	„	„	„
Chromatella . . .	Vibert.	Chromatella „ „	„	„	„	„
Circe	Hort.	Circe's „ „	„	„	„	„
Comtesse de Tolosan	„	Gräfin v. Tolos. „ „	„	„	„	„
Fleur de Matricaire .	„	Mutterkrautblüt. „	„	„	„	„
Jeanne d'Arc . . .	„	Jeanne d'Arc's „ „	„	„	„	„
Lafayette	„	Lafayette's „ „	„	„	„	„
Ophirie	„	Ophir „ „	„	„	„	„
petite	„	Kleine „ „	„	„	„	„
Phaêton	„	Phaêton's „ „	„	„	„	„
Vitellina	„	Dottergelbe „ „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Rosa						
ind. semperflorens .	Curt.	Immerblühende„ „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	1—5	China
Adm. de Rigny . .	Hort.	Ad. Rigny's „ „	„	„	„	Hybr.
Bouquet rouge . .	„	Rothe Bouquet „ „	„	„	„	„
Camellia	„	Camellien „ „	„	„	„	„
Camoens	„	Camoen's „ „	„	„	„	„
Cels multiflora . .	„	Cel's vielblum. „ „	„	„	„	„
centifolia	„	Centifolien „ „	„	„	„	„
cramoisi superieur .	„	Vorzügliche Kermesinfarbige „ „	„	„	„	„
Darius	„	Darius „ „	„	„	„	„
formosa	„	Schöne „ „	„	„	„	„
Grandwallei . . .	„	Grandwall's „ „	„	„	„	„
Louis Philippe . .	d'Ang.	Louis Philipp's „ „	„	„	„	„
Fries-Morel . . .	Hort.	Fries-Morel's „ „	„	„	„	„
Marjolin	Despr.	Marjolin's „ „	„	„	„	„
Marjolin	du Lux.	„ „ „	„	„	„	„
odorata	Hort.	Wohlriechende „ „	„	„	„	„
Pactolus	„	Pactolus „ „	„	„	„	„
Prince Charles . .	„	Prinz Carl's „ „	„	„	„	„
„ Eugene . .	„	Prinz Eugen's „ „	„	„	„	„
ranunculoides . . .	„	Ranunkelartige „ „	„	„	„	„
speciosa	„	Prächtige „ „	„	„	„	„
Stevensii	„	Steven's „ „	„	„	„	„
Theresia Stravius .	„	Th. Straviu's „ „	„	„	„	„
Triomphe de Gand .	„	Triumph v. Gent „ „	„	„	„	„
variegata	„	Bunte „ „	„	„	„	„
Virginale	„	Jungfräuliche „ „	„	„	„	„
Virginie Lebon . .	„	Virgin. Lebon's „ „	„	„	„	„
ind. Thea Alexina .	Hort.	Alexina's Thee „	„	„	„	„
Aurora	„	Morgenröthe „ „	„	„	„	„
Belle Allemende . .	„	Schöne Deutsche „	„	„	„	„
Bougére	„	Bougére's „ „	„	„	„	„
Bourbon	„	Bourbon „ „	„	„	„	„
Buret	„	Purpurschnecke „	„	„	„	„
Cenobi	„	Cenobi's „ „	„	„	„	„
Clara Sylvain . . .	„	Cl. Sylvain's „ „	„	„	„	„
Collwill's Crimson .	„	Collwill's carmoisinrothe „ „	„	„	„	„
Comte de Paris . .	„	Graf von Paris „ „	„	„	„	„
Devoniensis	„	Devonshire „ „	„	„	„	„
Diedrichsteinii . . .	„	Diedrichstein's „ „	„	„	„	„
Duchesse d'Orleans .	„	Herzogin v. Orl. „ „	„	„	„	„
Egine	„	Egine's „ „	„	„	„	„
Elisa Sauvage . . .	„	E. Souvage „ „	„	„	„	„
flavescens	„	Gelbliche „ „	„	„	„	„
Gigantesque . . .	„	Riesenmässige „ „	„	„	„	„
Goubault	„	Goubault's „ „	„	„	„	„
grandiflora	„	Grossblumige „ „	„	„	„	„
Hamon	„	Hamon's „ „	„	„	„	„
la Modeste	„	Die Bescheidene „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Rosa ind. Thea						
Lady Warender . .	Hort.	Fr. Warender's „ „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	1—5	Hybr.
Lewson Gower . .	„	LewsonGower's„ „	„	„	„	„
Louis XVIII. . . .	„	Ludwig XVIII. „ „	„	„	„	„
Mad. Jacqueminot .	„	Fr. Jaqueminot's „	„	„	„	„
Malton]	„	Malton's „ „	„	„	„	„
Moirée	„	Gemohrte „ „	„	„	„	„
Nisida	„	Nisida „ „	„	„	„	„
Princess Adelaide .	Hardy	Prinz. Adelaid. „ „	„	„	„	„
Princess Helene . .	Hort.	Prinz.Helenen's„ „	„	„	„	„
Princess Marie . .	„	Prinz. Marie's „ „	„	„	„	„
Reine de Bonaer . .	„	Königin d. Insel„ „	„	„	„	„
Reine de Golconda .	„	Kön. v.Golkonda „	„	„	„	„
Safrano	„	Safran „ „	„	„	„	„
Silène	„	Silene „ „	„	„	„	„
Smith's yellow . .	„	Smith's gelbe „ „	„	„	„	„
Souvenir d'un ami .	„	Freundes-Erinnerung „ „	„	„	„	„
Triomphe du Luxemburg. . . .	„	Triumph von Luxemburg „ „	„	„	„	„
Vicomtesse Decazes .	„	Vicegräfin Decazes „ „	„	„	„	„
Rubus	Plin.	Himbeere . . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
moluccanus	L.	Moluckische „	„	„	5—10	Amboina, Molucken
Russelia	Jacq.	Russelie. . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
juncea	Zucc.	Binsenartige „	„	„	10—15	Mexico
Sabal	Adans.	Sabalpalme . .	6, C. 3, O.	Palmæ		
Adansoni	Guerns.	Adanson's „	„	„	5—10	Carolina, Georg.
Palmetto	Lodd.	Graugrüne „	„	„	„	Florida
Salvia	Plin.	Salbey	2, C. 1, O.	Labiatæ		
fulgens	Cav.	Leuchtendrothe „	„	„	1—5	Mexico
gesneriaeflora . . .	Lindl.	Gesnerienblüth. „	„	„	„	Mexico, Guatem.
janthina	A. Diet.	Violette „	„	„	5—10	Mittel-Amerika
patens	Cav.	Abstehende „	„	„	1—5	Mexico
splendens	Sello	Glänzende „	„	„	5—10	Brasilien
Saxifraga	Diosc.	Steinbrech . .	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
sarmentosa	L.	Wuchernder „	„	„	1—5	China, Japan
Scheeria	Seem.	Scheerie. . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
mexicana.	Seem.	Mexicanische „	„	„	10—15	Chihuahua, (Nord-Mexico)
(Achimenes Scheerii .	Hort.)					
Securinega . . .	Juss.	Axtspott . . .	5, C. 3, O.	Euphorbiaceæ		
nitida	W.	Glänzender „	„	„	10—15	Mauritius
Sedum	Plin.	Sedum (Fetthenne)	10, C. 4, O.	Crassulaceæ		
Siboldi	Sweet.	Sibold's „	„	„	1—5	Japan
Selaginella . . .	P. B.	Selaginella (Moosfarren) .	24, C. 1, S.	Lycopodiaceæ		
altissima	Klotsch.	Höchste „	„	„	10—15	China ?
denticulata	Lk.	Gezähnelte „	„	„	5—10	S.-Eur.,N.-Afrika
(Lycopodium „	L.)					
uncinata	Spring.	Hakige „	„	„	10—15	China
(Lycopodium cæsium	Hort.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Senecio	L.	Kreuzkraut . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
Petasitis	D. C.	Pestwurzartiges „	„	„	1—5	Mexico
(Cineraria platanifolia	Schrank.)					
populifolius leucanthus	D. C.	Weissblumiges pappelblättr. „	„	„	„	Canar. Inseln
(Cineraria lactea . .	W.)					
hybr. Adela Villiers .	Hend.	Adela Villier's „	„	„	„	Hybr.
Annie	Hend.	Annie's „	„	„	„	„
Bessy	Hend.	Bessy's „	„	„	„	„
Calypso	Hort.	Calypso's „	„	„	„	„
compactus . . .	„	Dichtes „	„	„	„	„
Delight	Hend.	Wonne „	„	„	„	„
Eclipse	Hort.	Finsterniss „	„	„	„	„
Enchantress . . .	„	Zauberin „	„	„	„	„
„ superb . . .	„	Prächtiges „ „	„	„	„	„
Flora Mac Ivor .	Hend.	Ivor-Sohn's „	„	„	„	„
Madonna	Hort.	Jungfrauen „	„	„	„	„
Nymph	Hend.	Nymph „	„	„	„	„
Phyllis	Hort.	Phyllis „	„	„	„	„
Prince Arthur . .	„	Prinz Arthur's „	„	„	„	„
Queen of May . .	„	Königin d. Maies „	„	„	„	„
Sequoia	Endl.	Sequoia, (Bastard-Ceder) . . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
sempervirens . . .	Endl.	Immergrüne „	„	„	1—5	Californien
(Taxodium „	Lamb.)					
Soldanella	C. Gesn.	Drottelblume .	5, C. 1, O.	Primulaceæ		
alpina	L.	Alpen „	„	„	1—5	Mittel-Europa
Sollya	Lindl.	Sollye.	5, C. 1, O.	Pittosporeæ		
heterophylla . . .	Lindl.	Verschiedenblät. „	„	„	1—5	Neu-Holland
(Billardiera fusiformis	Labill.)					
Spigelia	L.	Spigelie	5, C. 1, O.	Gentianeæ		
marilandica	L.	Marylandische „	„	„	1—5	Maryland, Carol.
Stephanôtis . . .	Brong.	Kranzblume . .	5, C. 2, O.	Asclepiadeæ		
floribunda	Brong.	Vielblumige „	„	„	10—15	Madagascar
Strelitzia	Ait.	Strelitzie . . .	5, C. 1, O.	Musaceæ		
Reginae	Ait.	Königliche „	„	„	10—15	Cap
Strobilanthes . .	Blume.	Zapfenblume .	14, C. 2, O.	Personatæ		
maculata	Nees.	Gefleckte „	„	„	10—15	Silhet, Bengalen
(Ruellia „	Wall.)					
Stromanthe . . .	Sond.	Kreiselblume .	1, C. 1, O.	Scitamineæ		
sanguinea	Sond.	Blutrothe „	„	„	10—15	Ost-Indien
(Maranta „	Fisch.)					
Swainsonia . . .	Salisb.	Swainsonie . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
coronillaefolia . . .	Salisb.	Peltschenblättr. „	„	„	1—5	Neu-Holland
„ fl. rubro . . .	—	Rothe „ „	„	„	„	„
Greyana	Lindl.	Grey's „	„	„	„	„
Tecoma	Juss.	Tecoma	14, C. 2, O.	Personatæ		
jasminoides rosea .	Lindl.	Rosenrothe jasminartige „	„	„	1—5	Neu-Holland
Tectaria	Cav.	Deckelfarren .	24, C. 1, S.	Filices		
coriacea	Lk.	Lederartiger „	„	„	10—15 (5—10)	Amerika, Afrika und Australien
(Aspidium „ . .	W.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Thomasia	Gay.	Thomasie . . .	5, C. 1, O.	Büttneriaceæ		
solanacea	Gay.	Nachtschattenart. „	„	„	1—5	Neu-Holland
(Lasiopetalum „	Bot. Mag.)					
Thyrsacanthus . .	Nees.	Straussklaue .	2, C. 1, O.	Personatæ		
rutilans	Pl. et Lind.	Röthliche „	„	„	10—15	Mittel-Amerika
strictus	Nees.	Gerade „	„	„	„	Hondur., M.-Am.
(Eranthemum cocci-neum	Lem.)					
Tigridia	Juss.	Tigerblume . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
Pavonia	Juss.	Pfauen „	„	„	1—5	Mexico
Trachelium . . .	Pon.	Halskraut . . .	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
coeruleum	L.	Blaues „	„	„	1—5	Italien, Levante
Tradescantia. . .	Rupp.	Tradescantie .	6, C. 1, O.	Commelineæ		
zebrina	Hort.	Zebrastreifige „	„	„	10—15	Süd-Amerika
(Cyonatis vittata . .	Lindl.)					
Tristania	R. Br.	Tristanie . . .	18, C. 3, O.	Myrtaceæ		
laurina	R. Br.	Lorbeerartige „	„	„	1—5	Neu-Holland
macrophylla . . .	Cunning.	Grossblättrige „	„	„	„	„
neriifolia	R. Br.	Oleanderblättr. „	„	„	„	„
Tritonia	Gawl.	Tritonie. . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
aurea	Pappe.	Goldgelbe „	„	„	1—5	Cap
crocata	Ker.	Safranfarbige „	„	„	„	„
odorata	Lindl.	Wohlriechende „	„	„	„	„
Tropaeolum . . .	L.	Capuzinerkresse	8, C. 1, O.	Tropaeoleæ		
pentaphyllum . . .	Lam.	Fünfblättrige „	„	„	1—5	Uruguay, S.-Am.
(Chimocarpus „	D. Don.)					
speciosum	Poep. et Endl.	Prächtige „	„	„	„	Chile
Veltheimia. . . .	Gledit.	Veltheimie . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
viridifolia	Jacq.	Grünblättrige „	„	„	1—5	Cap
Verbena	L.	Eisenkraut . .	14, C. 2, O.	Verbenaceæ		
hyb. Defiance . . .	Robin.	Herausfordernd. „	„	„	1—5	Hybr.
Heroine	Dufoy.	Heldin „	„	„	„	„
Magnificent . . .	Woods.	Prächtiges „	„	„	„	„
Mont blanc . . .	Hort.	Schneehügel „	„	„	„	„
Morpheus. . . .	Chauv.	Morpheus „	„	„	„	„
Princesse Mariana .	Bouch.	Prinzess Marianen's „	„	„	„	„
Veronica	Fuchs.	Ehrenpreis . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
Andersonii	Lindl.	Anderson's „	„	„	1—5	Hybr.
formosa	R. Br.	Schöner „	„	„	„	Van Diem. Land
hybrida	Liabou.	Bastard „	„	„	„	Hybr.
Lindleyana	Paxt.	Lindley's „	„	„	„	Neu-Seeland
salicifolia.	Forst.	Weidenblättrig. „	„	„	„	„
speciosa	R. Cunning.	Prächtiger „	„	„	„	„
variegata	Veitch.	Bunter „	„	„	„	Hybr.
Viburnum	Virg.	Schneeball . .	5, C. 3, O.	Caprifoliaceæ		
Tinus	L.	Lorbeerartiger „	„	„	1—5	S.-Eur. (S.-Krain)
Vinca	Plin.	Sinngrün . . .	5, C. 1, O.	Apocyneæ		
rosea	L.	Rosenrothes „	„	„	10—15	Madagaskar
„ fl. albo . . .	—	Weissblumiges „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Erforderl. Wärmegr. nach Reaumur.	Vaterland.
Witsenia.	Thb.	Witsenie . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
corymbosa	Sm.	Doldentraubige „	„	„	5—10	Cap
Yucca	Dalech.	Palmenlilie . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Draconis	L.	Drachenbaumart.„	„	„	1—5	Süd-Carolina
longifolia.	Karw.	Langblättrige „	„	„	„	Mexico
(Dasylirion „	Zucc.)					
Xanthosôma . . .	Schott.	Gelbleib . . .	21, C. 7, O.	Aroideæ		
sagittifolium . . .	Schott.	Pfeilblättriger „	„	„	10—15	West-Indien
(Caladium „	Vent.)					
Zephyranthes . .	Herb.	Zephyrblume .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
grandiflora	Lindl.	Grossblumige „	„	„	5—10	Mexico

Stauden-Gewächse.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Acanthus	L.	Stachelblume (Bärenklau) .	14, C. 2, O.	Personatæ		
mollis	L.	Aechte "	"	"	2—3′	Ital., Griechenl.
Achillea	L.	Garbe	19, C. 2, O.	Compositæ		
filipendulina Eupatoria	D. C.	Alpkrautartige "	"	"	3—4′	Kaukasus
Aconitum	Theoph.	Eisenhut . . .	13, C. 3, O.	Ranunculaceæ		
Lycoctonum galectonum	Rchb.	Behelmter-Wolfs "	"	"	3′	(Deutschland)
orientale	Mill.	Morgenländisch. "	"	"	5—6′	Sibir., Kaukasus
pyramidale	Mill.	Pyramidenförm. "	"	"	4—5′	Böhmen, Steierm.
Störkeanum	Rchb.	Störk's "	"	"	3—4′	Süd-Deutschland
variegatum	L.	Bunter "	"	"	3—4′	Kärnthen, Italien
Adenôphora . . .	Fisch.	Drüsenträger .	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
coronata	A. D. C.	Bekränzter "	"	"	2—3′	Dahurien, Sibir.
stylosa	Fisch.	Langgriffliger "	"	"	3′	Sibirien
Adonis	Matth.	Adonis	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
vernalis	L.	Frühling's "	"	"	1′	Sibir., S.-Deutshl.
Allium	Plin.	Lauch	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Moly	L.	Gelbblühender "	"	"	1′	Ungarn, Frankr.
sphaerocephalum .	Schult.	Rundköpfiger "	"	"	2′	Ital., S.-Deutschl.
Althaea	Diosc.	Althäe	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
cannabina	L.	Hanfblättrige "	"	"	7—8′	Krain, Italien
rosea fl. pl.	Cav.	Gef. Stockrosen "	"	"	8—10′	Morgenland
Alyssum	Diosc.	Steinkraut. . .	15, C. 1, O.	Cruciferæ		
saxatile	L.	Felsen "	"	"	1′	Russl., Podolien
Wierzbickii	Reich.	Wierzbick's "	"	"	1′	Ungarn
Amsonia	Walt.	Amsonie	5, C. 1, O.	Apocyneæ		
salicifolia	Pursh.	Weidenblättrige "	"	"	1′	Nord-Amerika
Anemone	Diosc.	Windröschen .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
japonica	Sieb.	Japanisches "	"	"	1′	Japan
nemorosa fl. pl. . .	L.	Gefülltes Busch "	"	"	½′	(Deutschland)
Anthericum . . .	L.	Zaunlilie . . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Liliago	"	Astlose "	"	"	2—3′	Deutschland
ramosum	"	Aestige "	"	"	2—3′	"
Antirrhinum . . .	L.	Löwenmaul . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
majus	"	Grosses "	"	"	1½′	Süd-Europa
Aquilegia	Trag.	Akeley	13, C. 5, O.	Ranunculaceæ		
alpina	L.	Alpen "	"	"	2—3′	Schweiz Schles.
canadensis	"	Canadische "	"	"	1′	Virgin., Canada
vulgaris	"	Gemeine "	"	"	2—3′	Deutschland
Arum	L.	Aron	21, C. 7, O.	Aroideæ		
italicum	Mill.	Italienisches "	"	"	2′	Süd-Europa

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Asclepias	Diosc.	Schwalbenwurz	5, C. 2, O.	Asclepiadeæ		
incarnata.	L.	Fleischfarbige „	„	„	2—3′	Nord-Amerika
pulchra	Ehrh.	Schöne „	„	„	„	„
Asphodelus . . .	Theoph.	Affodill	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
luteus	L.	Gelber „	„	„	2—3′	Sicilien
ramosus	L.	Aestiger „	„	„	„	Süd-Europa
Aster	L.	Sternblume . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
alpinus	L.	Alpen „	„	„	1/4′	Pyren., S.-Dtschl.
Amellus	L.	Virgil's „	„	„	2′	Süd-Deutschland
amplexicaulis . . .	Mühl.	Stengelumfass. „	„	„	2′	Virgin., Pensylv.
cordifolius	L.	Herzblättrige „	„	„	2—3′	Canada, Florida
ericoides	L.	Heideartige „	„	„	3′	Nord-Amerika
mutabilis.	Ait.	Veränderliche „	„	„	5′	„
novae Angliae. . .	Ait.	Neuenglische „	„	„	5—6′	„
„ „ roseus	D. C.	Rosenrothe „ „	„	„	4—5′	?
thyrsiflorus	Hoffm.	Straussblüthige „	„	„	4′	Virginien?
Tradescanti. . . .	L.	Tradescant's „	„	„	4′	Nord-Amerika
vimineus	W.	Schlanke „	„	„	3—4′	„
Astragalus . . .	L.	Tragant	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
canadensis	L.	Canadischer „	„	„	3—4′	Nord-Amerika
Onobrychis	L.	Esparsetten „	„	„	2—3′	Oestreich, Tyrol
Astrantia	L.	Sterndolde . .	5, C. 2, O.	Umbelliferæ		
major	L.	Grosse „	„	„	1 1/2—2′	Süd-Deutschland
Aubrietia	Adans.	Aubrietie . . ,	15, C. 1, O.	Cruciferæ		
deltoidea.	D. C.	Deltaförmige „	„	„	1/4′	Ital., Griechenl.
Baptisia	Vent.	Baptisie. . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
australis	R. Br.	Südliche „	„	„	2—3′	Carolina
exaltata	Swt.	Hohe „	„	„	3′	Nord-Amerika
minor	Lehm.	Kleinere „	„	„	1 1/2—2′	„
versicolor	Lodd.	Verschiedenfarb. „	„	„	„	„
Bellis	L.	Gänseblume, (Masslieben) .	19, C. 2, O.	Compositæ		
perennis fl. albo pl. .	(L.)	Weissgefüllte „	„	„	1/4′	(Europa)
„ fl. coccineo pl. . .	„	Scharlachrothgef. „	„	„	„	
Betonica.	L.	Betonie	14, C. 1, O.	Labiatæ		
grandiflora	W.	Grossblumige „	„	„	2′	Sibirien
Biotia	D. C.	Biotie.	19, C. 2, O.	Compositæ		
macrophylla . . .	D. C.	Grossblättrige „	„	„	2′	Nord-Amerika
„ divaricata . . .	D. C.	Ausgebreitete „ „	„	„	„	„
(Aster divaricatus .	L.)					
Boltonia.	Herit.	Boltonie. . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
glastifolia	Herit.	Graublättrige „	„	„	6—8′	Nord-Amerika
Buphthalmum . .	Neck.	Ochsenauge . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
salicifolium	D. C.	Weidenblättrig. „	„	„	1—1 1/2′	Süd-Deutschl.
Caltha.	C. Gesn.	Dotterblume. .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
palustris fl. pl. . .	L.	Gef. Sumpf „	„	„	1′	Deutschland
„ „ „ major.	—	Grosse „ „ „	„	„	„	
Calystegia. . . .	R. Br.	Kelchkleid, (Bärwinde) . . .	5, C. 1, O.	Convolvulaceæ		
pubescens	Lindl.	Feinhaariges „	„	„	6—10′	Nord-China
sepium var. rosea .	(R. Br.)	Rosenroth. Zaun „	„	„	10—15′	Nord-Amerika
(Convolvulus „	L.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Campanula. . . .	Dodon.	Glockenblume .	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
caespitosa	Scop.	Rasenartige „	„	„	¼′	M.-Eur., Kärnth.
carpathica	Jacq.	Karpathische „	„	„	1′	Karpathen
glomerata speciosa .	(L.)	Schöne Knauelblüth. „	„	„	1½′	Sibirien, Kaukas.
grandis	Fisch. et Mey.	Grosse „	„	„	3′	Anadoly, Kleinas.
latifolia	L.	Breitblättrige „	„	„	3—4′	Süd-Deutschl.
„ alba . . .	Hort.	Weisse „ „	„	„	2—3′	
„ macrantha .	A. D. C.	Grossblumige „ „	„	„	4—5′	Kaukasus
Medium	L.	Marietten „	„	„	2′	Italien
nobilis	Lindl.	Edle „	„	„	1—2′	China, Chusan
„ fl. albo . .	—	Weissblumige „	„	„	1—2′	
persicifolia	L.	Pfirsichblättrige „	„	„	2—3′	Deutschland
pulla	L.	Dunkelblaue „	„	„	¼′	Oestr., Kärnthen
Centaurea	L.	Flockenblume .	19, C. 3, O.	Compositæ		
dealbata	W.	Weissblättrige „	„	„	1—2′	Kaukasus
macrocephala . . .	Muss. Pus.	Grossköpfige „	„	„	2—3′	Span., Portugal
montana	L.	Berg „	„	„	1—1½′	Süd-Deutschl.
pulcherrima . . .	W.	Schönste „	„	„	1½—2′	Iber. (Kaukasus)
Chelone	Dill.	Schildblume . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
glabra	L.	Glatte „	„	„	1½—2′	Nord-Amerika
obliqua	L.	Schiefe „	„	„	„	„
Cimicifuga. . . .	L.	Wanzenkraut .	13, C. 1, O.	Ranunculaceæ		
racemosa	Ell.	Traubenblüthig. „	„	„	4—5′	Canada, Florida
(Actaea „	L.)					
Clematis.	Diosc.	Waldrebe . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
angustifolia	Jacq.	Schmalblättrige „	„	„	3—4′	Daurien
(lasiantha	Fisch.)					
erecta	L.	Aufrechte „	„	„	4—5′	Oestr., Böhmen
integrifolia	L.	Ganzblättrige „	„	„	3—4′	Ungarn, Sibirien
tubulosa	Turcz.	Röhrenblüthige „	„	„	2′	Mongolei
Viorna	L.	Glockenblüthige „	„	„	6—7′	Nord-Amerika
Convallaria . . .	L.	Mayblume . . .	6, C. 1, O.	Smilacineæ		
majalis	„	Gemeine „	„	„	½′	Deutschland
Coreopsis	L.	Wanzenauge . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
delphinifolia . . .	Lam.	Rittersspornblätt. „	„	„	3′	Nord-Amerika
Crinitaria	Less.	Haarblume . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
Linosyris	Less.	Leinblättrige „	„	„	2′	Deutschland
(Chrysocoma „	L.)					
Crocus	Cels.	Safran.	3, C. 1, O.	Irideæ		
vernus	All.	Frühling's „	„	„	¼′	M. u. Ost-Europa, (Süd-Deutschl.)
Crucianella . . .	L.	Kreuzblatt . .	4, C. 1, O.	Rubiaceæ		
stylosa	Trin.	Langgriffliges „	„	„	½′	Ghilan, (Persien
Cypripedium. . .	L.	Frauenschuh. .	20, C. 2, O.	Orchideæ		
Calceolus	„	Gemeiner „	„	„	1′	Deutschland
Czackia	Andrz.	Czackia	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
Liliastrum	Andrz.	Lilienartige „	„	„	1—1½′	Schweiz, Italien
(Anthericum „	L.)					
Delphinium . . .	Tourn.	Rittersporn . .	13, C. 3, O.	Ranunculaceæ		
Barlowii	Lindl.	Barlow's „	„	„	2′	Hybr.
cheilanthum. . . .	Fisch.	Schleierblüthiger „	„	„	4—5′	Daurien
ciliatum	Stev.	Gewimperter „	„	„	6—7′	?
grandiflorum . . .	L.	Grossblumiger „	„	„	3′	Sibirien

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Desmodium . . .	D. C.	Fesselhülse . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
canadense	D. C.	Canadische „	„	„	2—3′	Nord-Amerika
Dianthus	L.	Nelke	10, C. 2, O.	Caryophylleæ		
barbatus	„	Bart „	„	„	1′	Süd-Deutschl.
Caryophyllus fl. pl. .	„	Gef. Garten „	„	„	2′	Ital., Süd-Tyrol
chinensis	„	Chinesische „	„	„	1′	China
cruentus	Fisch.	Blutrothe „	„	„	1½′	Kaukasus
plumarius fl. pl. . .	L.	Gef. Feder „	„	„	½′	Nieder-Oestreich
Diclytra	D. C.	Doppelsporn. .	17, C. 4, O.	Fumariaceæ		
formosa	D. C.	Schöner „	„	„	½′	Nord-Amerika
(Corydalis „	Pursh.)					
spectabilis	D. C.	Ansehnlicher „	„	„	2′	N.-China, Sibirien
(Corydalis „	Pers.)					
(Dicentra „	Lem.)					
Dictamnus	Brunf.	Diptam	10, C. 1, O.	Rutaceæ		
fraxinella alba . . .	D. C.	Weis. eschenblät. „	„	„	2—3′	Frankr., S.-Dschl.
„ purpurea . .	D. C.	Purpurrother „ „	„	„	„	„
Digitalis	Fuchs.	Fingerhut . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
ambigua	Murr.	Blassgelber „	„	„	2′	Deutschland
purpurea	L.	Purpurrother „	„	„	3—4′	„
Doronicum	L.	Gemswurzel . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
caucasicum	Bieb.	Kaukasische „	„	„	1½′	Kaukas., S.-Tyrol
Dracocephalum. .	L.	Drachenkopf. .	14, C. 1, O.	Labiatæ		
speciosum	Sweet.	Prächtiger „	„	„	3′	Nord-Amerika
(Physostegia „	Benth.)					
Dracunculus . . .	Tourn.	Schlangenkraut	21, C. 7, O.	Aroideæ		
vulgaris	Schott.	Gemeines „	„	„	2′	Süd-Europa
(Arum Dracunculus .	L.)					
Echinops	L.	Kugeldistel . .	19, C. 5, O.	Compositæ		
dahuricus angustilobus	Fisch.	Schmallappige Daurische „	„	„	2′	Daurien
(ruthenicus	Bess.)					
sphaerocephalus . .	L.	Gemeine „	„	„	6—8′	Oestreich, Baiern
Erigeron.	L.	Berufkraut . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
glabellum	Nutt.	Glattliches „	„	„	1—1½′	Nord-Amerika
kamtschaticum . .	D. C.	Kamtschatkisch. „	„	„	„	Kamtschatka
speciosum	D. C.	Prächtiges „	„	„	2′	Californien
(Stenactis „	B. M.)					
Eryngium	Tourn.	Ziegenbart (Mannstreu) . .	5, C. 2, O.	Umbelliferæ		
alpinum	L.	Alpen „	„	„	2′	Schweiz, Italien
amethystinum . . .	L.	Blauer „	„	„	1—2′	Krain, Süd-Tyrol
giganteum	Bieb.	Riesenhafter „	„	„	3—4′	Armenien
planum	L.	Flachblättriger „	„	„	2—3′	Nied.-Oestreich, Böhmen
Eupatorium . . .	L.	Wasserdost . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
ageratoides	L. Fil.	Ageratumartiger „	„	„	3′	Nord-Amerika
maculatum	L.	Gefleckter „	„	„	3—4′	„
Fritillaria	C. Ges.	Becherblume .	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
Imperialis	L.	Kaiserkronen „	„	„	2—3′	Persien
„ fl. luteo . . .	—	Gelbblumige „ „	„	„	„	
„ fol. varieg. . .	—	Buntblättrige „ „	„	„	„	
Meleagris	L.	Perlhuhnfleckige „	„	„	1′	Ital., S.-Deutschl.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Fuchsia	Plum.	Fuchsie	8, C. 1, O.	Onagrariæ		
Thomsonii	H. Angl.	Thomson's „	„	„	4'	Hybr.
virgata	Lindl.	Ruthenförmige „	„	„	4—5'	Mexico
Funkia	Spr.	Funkie	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
grandiflora	Sieb. et Zucc.	Grossblumige „	„	„	1'	Japan
marginata	Hook.	Geränderte „	„	„	1'	„
ovata	Spr.	Eiförmige „	„	„	1½'	„
(Hemerocallis coerulea . . .	Andr.)					
Sieboldiana	Lodd.	Siebold's „	„	„	1'	„
undulata	Ott. et Diet.	Wellenförmige „	„	„	1'	„
Galanthus	L.	Schneeglöckchen	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
nivalis fl. pl. . . .	„	Gef. gemeines „	„	„	½'	Süd-Deutschl.
Galatella	Cass.	Galatella . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
hyssopifolia. . . .	Nees.	Isopblättrige „	„	„	3'	Nord-Amerika
punctata	D. C.	Punctirte „	„	„	4'	Ungarn, Kaukas.
(Aster acris. . . .	L.)					
Galega	L.	Geissraute . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
officinalis	„	Gemeine „	„	„	2—3'	Mähren, Italien
Geranium	L.	Kranichschnabel	16, C. 6, O.	Geraniaceæ		
macrorrhizon . . .	„	Dickwurzlicher „	„	„	1'	Ital., S.-Deutschl.
pratense	„	Wiesen „	„	„	2'	Deutschland
„ fl. albo . . .	—	Weissblumiger „ „	„	„	2'	
sibiricum.	L.	Sibirischer „	„	„	1'	Sibir., Kaukasus
Gillenia	Moench.	Gillenie	12, C. 5, O.	Rosaceæ		
trifoliata	Moench.	Dreiblättrige „	„	„	2—3'	Nord-Amerika
Gladiolus	Plin.	Siegwurz . . .	3, C. 1, O.	Irideæ		
communis	L.	Gemeine „	„	„	2'	Ital., S.-Deutschl.
Gypsophila . . .	L.	Gypskraut. . .	10, C. 2, O.	Caryophylleæ		
paniculata	„	Rispenblüthiges „	„	„	1—2'	Sibirien, Sicilien, Nieder-Oestreich
Hedysarum . . .	L.	Hahnenkopf . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
coronarium	„	Bekränzter „	„	„	2—3'	Italien
elongatum	Fisch.	Verlängerter „	„	„	„	Russland
Helenium	L.	Helenie	19, C. 2, O.	Compositæ		
autumnale	„	Herbst „	„	„	5'	Canada, Carolina
Helianthus	L.	Sonnenblume .	19, C. 3, O.	Compositæ		
angustifolius . . .	Michx.	Schmalblättrige „	„	„	4—5'	Virgin., Florida
decapetalus	L.	Zehnblättrige „	„	„	5'	Canada
Maximiliani	Schrad.	Maximilian's „	„	„	6—8'	Nord-Amerika
mollis	Lam.	Weiche „	„	„	7—8'	„
multiflorus fl. pl. . .	L.	Gef. Vielblumige „	„	„	5—6'	Canada, Pensylv.
salicifolius	Ott. et Diet.	Weidenblättrige „	„	„	8—10'	Nord-Amerika
Heliopsis	Pers.	Sonnenauge . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
scabra	Dunal.	Scharfes „	„	„	5—6'	Nord-Amerika
Helleborus. . . .	Theoph.	Niesswurz . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
niger	L.	Schwarze „	„	„	1'	Süd-Deutschl.
Hemerocallis . .	L.	Taglilie	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
aurantiaca	Sieb.	Orangenfarbige „	„	„	2'	?
flava	L.	Gelbe „	„	„	2'	Sib., Krain, Kärnt.
fulva	L.	Braunrothe „	„	„	3'	China
graminea.	Andr.	Grasblättrige „	„	„	1½'	Sibirien, Schweiz

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Hepatica	Dill.	Leberblume	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
triloba coerulea pl.	Chaix.	Blaugefüllte dreilappige „	„	„	1/4'	(Deutschland)
„ rubra pl.	—	Rothgefüllte „ „	„	„	„	
Heracleum	L.	Bärenklau (Heilkraut)	5, C. 2, O.	Umbelliferæ		
pubescens	Bieb.	Weichhaariges „	„	„	5—6'	Taurien, Kaukas.
Hesperis	L.	Nachtviole	15, C. 2, O.	Cruciferæ		
matronalis fl. albo pl.	(L.)	Weissgefüllte „	„	„	2'	(Mittel-Europa)
Hoteia	Morr. et Dec.	Hoteia	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
japonica	„	Japanische „	„	„	1'	Japan
Hyacinthus	Colum.	Hyacinthe	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
orientalis variet.	L.	Morgenländische „	„	„	1—1 1/2'	(Asien, Afrika)
„ fl. pl. variet.	—	Gefüllte „ „	„	„	„	
Iberis	L.	Schleifenblume	15, C. 1, O.	Cruciferæ		
sempervirens	„	Immergrüne „	„	„	1'	Italien
Inula	L.	Alant	19, C. 2, O.	Compositæ		
Helenium	„	Wahrer „	„	„	4—6'	Mittel-Europa
salicina	„	Weidenblättrig. „	„	„	1'	Ital., Schw., Frkr.
squarrosa	„	Sparriger „	„	„	1—2'	Italien, Krain
thapsoides vart. Biebersteinii	D. C.	Bieberstein's wollkrautartiger „	„	„	2—3'	Kaukasus
Vaillantii	Vill.	Vaillant's „	„	„	1—2'	Südl. Schweiz
Iris	Theoph.	Schwertlilie	3, C. 1, O.	Irideæ		
amoena	Redout.	Angenehme „	„	„	1 1/2'	?
bohemica	Schmidt	Böhmische „	„	„	1'	Böhmen
furcata	Bieb.	Gabelförmige „	„	„	1'	Kaukasus
germanica	L.	Deutsche „	„	„	1 1/2'	Deutschland
„ fl. albo	—	Weisse „ „	„	„	„	
„ fl. violaceo	—	Violette „ „	„	„	„	
graminea	L.	Grasblättrige „	„	„	1'	Süd-Deutschl.
halophila	Pall.	Salzliebende „	„	„	1 1/2'	Sibirien
hungarica	Kit.	Ungarische „	„	„	1'	Ungarn
neglecta	Horn.	Vernachlässigte „	„	„	„	?
notha	Bieb.	Bastard „	„	„	2'	Kaukasus
picta	Mill.	Bemalte „	„	„	1'	?
pumila violacea	L.	Niedrige violette „	„	„	1/2'	Nied.-Oestreich
sambucina	L.	Hollunder „	„	„	2'	Süd-Europa
sibirica	W.	Sibirische „	„	„	3'	Sibir., Deutschl.
stenogyna	D. C.	Verengte „	„	„	2'	Kaukasus
triflora	Balb.	Dreiblumige „	„	„	2'	Italien
variegata	L.	Bunte „	„	„	1'	Oestreich
venusta	Hort.	Anmuthige „	„	„	2'	Hybride
versicolor	L.	Verschiedenfarb. „	„	„	1'	Nord-Amerika
Lathyrus	L.	Platterbse	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
latifolius	L.	Breitblättrige „	„	„	5—6'	Europa
Ligularia	Cass.	Zungenblume	19, C. 2, O.	Compositæ		
macrophylla	D. C.	Grossblättrige „	„	„	3—4'	Sibirien
(Cineraria „	Ledeb.)					
sibirica	Cass.	Sibirische „	„	„	3'	„
„ speciosa	D. C.	Prächtige „ „	„	„	2—3'	Daurien
(Cineraria speciosa	Schrad.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Lilium.	Virg.	Lilie	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
bulbiferum	L.	Feuer „	„	„	2—3′	Ital., S.-Deutschl.
„ croceum . . .	—	Safranfarbige „ „	„	„	„	
candidum	L.	Weisse „	„	„	3′	Süd-Europa
chalcedonicum. . .	„	Krull „	„	„	2—3′	Pers., Kärnthen
daûricum	Ker.	Daûrische „	„	„	2′	Daurien
(spectabile	Fisch.)					
Martagon	L.	Gelbwurzlige „	„	„	3′	Ung., S.-Deutsch.
„ fl. albo . . .	—	Weisse „ „	„	„	„	
pyrenaicum	Gouan.	Pyrenaische „	„	„	2′	Pyrenäen
superbum	L.	Stolze „	„	„	5—6′	Nord-Amerika
tigrinum	Gawl.	Tiger „	„	„	3—4′	China
Lindelofia	Lehm.	Lindelofie . . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
spectabilis	Lehm.	Ansehnliche „	„	„	1′	Kaschmir (Asien)
(Cynoglossum longiflorum	Benth.)					
Lithospermum . .	Diosc.	Steinsame . . .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
pulchrum.	Lehm.	Schöner „	„	„	1′	Virginien
(Pulmonaria virginica	L.)					
(Mertensia „	Pers.)					
Lupinus	L.	Wolfsbohne . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
polyphyllus versicolor	Dougl.	Verschiedenfarb. vielblättrige „	„	„	3′	Nord-Amerika
variegatus	Poir.	Bunte „	„	„	1½′	„
Lychnis	Theoph.	Lichtnelke . .	10, C. 4, O.	Caryophylleæ		
chalcedonica . . .	L.	Chalcedonische „	„	„	3—4′	Orient
„ fl. pl.	—	Gefüllte „ „	„	„	„	
coronaria	L.	Kron „	„	„	2′	S.-Eur. (S.-Dtchl.)
„ fl. pl.	—	Gefüllte „ „	„	„	„	
Flos Jovis	L.	Schirmtraubige „	„	„	1½′	S.-Eur. (S.-Tyrol)
Viscaria fl. pl.. . .	(L.)	Gef. klebrige „	„	„	1′	(Deutschland)
Lythrum.	L.	Weiderich. . .	11, C. 1, O.	Lythrariæ		
Salicaria superbum .	(L.)	Prächt. gemein. „	„	„	3′	(Deutschland)
virgatum.	L.	Ruthenförmiger „	„	„	„	Sib., Böhm., Mähr.
Monarda.	L.	Monarde. . . .	2, C. 1, O.	Labiatæ		
didyma	L.	Scharlachrothe „	„	„	2—3′	Pensylvanien
purpurea.	Pursh.	Purpurrothe „	„	„	3—4′	Virginien
Muscari	Clus.	Traubenhyacinthe .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
botryoides	Mill.	Steifblättrige „	„	„	½′	S.-Eur. (Dtschl.)
comosum.	W.	Schopfblüthige „	„	„	1′	Mittel- u. S.-Eur. (Oestr., Baiern)
„ monstrosum. .	Mill.	Monströse „ „	„	„	„	
Myosotis.	Diosc.	Mauseohr, (Vergissmeinnicht)	5, C. 1, O.	Boragineæ		
alpestris	Schm.	Alpen „	„	„	1′	Krain, Ungarn
Narcissus	L.	Narcisse. . . .	6, C. 1, O.	Amaryllideæ		
Jonquilla.	L.	Jonquillen „	„	„	1′	Italien, Spanien
„ fl. pl.	—	Gefüllte „ „	„	„	„	
poeticus	L.	Rothrandige „	„	„	„	Ital., S.-Deutschl.
„ fl. pl.	—	Gefüllte „ „	„	„	„	
Pseudonarcissus . .	L.	Gemeine „	„	„	„	Süd-Deutschl.
„ fl. pl.	—	Gefüllte „ „	„	„	„	
Tazetta	L.	Tazetten „	„	„	„	Süd-Europa

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Obeliscaria . . .	Cass.	Spitzsäule . . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
pinnata	Cass.	Gefiederte „	„	„	5—6′	Nord-Amerika
(Rudbeckia „	Vent.)					
Oenothera	L.	Nachtkerze . .	8, C. 1, O.	Onagrariæ		
Fraseri	Pursh.	Fraser's „	„	„	1½′	Carolina
riparia	Nutt.	Ufer „	„	„	1′	„
Omphalodes . . .	Tourn.	Gedenkemein .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
verna	Moench.	Frühling's „	„	„	½′	Portugal, Krain, Kärnthen
(Cynoglossum Omphalodes . . .	L.)					
Ononis.	L.	Hauhechel . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
rotundifolia	L.	Rundblättrige „	„	„	1′	Krain, Süd-Tyrol
Orobus	L.	Walderbse . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
lathyroides	L.	Platterbsenart. „	„	„	1½′	Sibirien
vernus	L.	Frühling's „	„	„	1′	Deutschland
Paeonia	Diosc.	Paeonie	13, C. 2, O.	Ranunculaceæ		
albiflora	(Pall.)					
„ Buyckii	Buyck.	Buyck's weissblühende „	„	„	2′	(Sibirien, China) Hybr.
„ Duchesse d'Orleans	Guérin.	Herzogin v. Orl. „ „	„	„	„	„
„ edulis superba . .	Lemon.	Stolze „ „	„	„	„	„
„ eleg. superbissima.	Buyck.	Stolzeste „ „	„	„	„	„
„ fragrans	Anders.	Duftende „ „	„	„	„	„
„ Humei . , . . .	Anders.	Hume's „ „	„	„	„	„
„ lutea plenissima .	Buyck.	Gefüllt. gelbe „ „	„	„	„	„
„ papaveriflora . .	Lemon.	Mohnblüthige „ „	„	„	„	„
„ plenissima rosea superba . . .	Buyck.	Stolze rosenrothe „ „	„	„	„	„
„ prolifera tricolor .	Lemon.	Dreifarbige sprossende „ „	„	„	„	„
„ Reine des Français	Guèrin.	Königin der Franzosen „ „	„	„	„	„
„ rosea delicatissima	—	Zart. rosenrothe „ „	„	„	„	„
„ tricolor grandiflora	Buyck.	Grossblumige dreifarbige „ „	„	„	„	„
„ tricolor ros. lilacina	—	Lila rosafarb. „ „	„	„	„	„
„ Triomph du Nord	Miellez.	Des Nordens Triumph „ „	„	„	„	„
„ Victoire Modeste .	Guérin.	Besch. Sieges „ „	„	„	„	„
„ Whitleji	Anders.	Whitley's „ „	„	„	„	„
humilis pleno . . .	Retz.	Gef. niedrige „ „	„	„	1½′	Spanien
officinalis	(L.)					
„ albicans pl. . .	Anders.	Weissgef. gem. „	„	„	2′	(Süd-Europa)
officinalis fl. pl. . .	—	Gefüllte „ „	„	„	„	
„ rosea pl. .	S. Dyck.	Gef. rosenrothe „ „	„	„	„	
tenuifolia pl. . . .	Sweet.	Gef. feinblättr. „	„	„	1½′	(Sibirien)
Papaver	Virg.	Mohn	13, C. 1, O.	Papaveraceæ		
orientale	L.	Morgenländisch. „	„	„	2—3′	Orient
„ bracteatum .	Fisch.	Deckblättriger „	„	„	3′	
Pascalia	Ort.	Pascalie	19, C. 2, O.	Compositæ		
glauca	Ort.	Graugrüne „	„	„	4′	Chile
Phalaris	Diosc.	Glanzgras . . .	3, C. 2, O.	Gramineæ		
arundinacea fol. varieg.	L.	Buntes rohrart. „	„	„	1½′	(Deutschland)

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Phlomis	Diosc.	Phlomis (Flammenkraut) .	14, C. 1, O.	Labiatæ		
Russeliana	Lag.	Russel's „	„	„	2—4′	Syrien
tuberosa	L.	Knollige „	„	„	4—5′	Sibirien
Phlox	L.	Flammenblume .	5, C. 1, O.	Polemoniaceæ		
acuminata	Pursh.	Langgespitzte „	„	„	3—4′	Georgien, Carol.
„ alba . . .	Hort.	Weisse „ „	„	„	2—3′	Hybr.
alba compacta. . .	Hort.	Dichte weisse „	„	„	1½—2′	„
„ Kermesina . .	Hort.	Kermesinweisse „	„	„	„	„
carnea	Ker.	Fleischfarbige „	„	„	1′	Nord-Amerika
coerulea rubescens .	Hort.	Blauröthliche „	„	„	2—3′	Hybr.
cordata grandiflora .	(Elliot.)	Grossblumige herzblättrige „	„	„	3′	„
divaricata	L.	Ausgebreitete „	„	„	1′	Pensylvanien
glaberrima	L.	Glatte „	„	„	„	Virginien
maculata.	L.	Gefleckte „	„	„	„	„
Mandelii	Hort.	Mandel's „	„	„	2—3′	Hybr.
omniflora.	Hort.	Vollblumige „	„	„	1′	„
paniculata	L.	Rispenblüthige „	„	„	4′	Nord-Amerika
„ fl. albo . .	—	Weissblumige „ „	„	„	„	„
Princesse Mariane .	Hort.	Prinz. Marianen's „	„	„	3′	Hybr.
procumbens . . .	Lodd.	Niederliegende „	„	„	¼′	Nord-Amerika
reptans verna . . .	Mx.	Kriech. Frühl. „	„	„	„	„
scabra	Sweet.	Scharfe „	„	„	3—4′	„
setacea	W.	Borstenblättrige „	„	„	¼′	Virgin., Carolina
speciosissima . . .	Hort.	Prächtigste „	„	„	2—3′	Hybr.
suaveolens	Ait.	Duftende „	„	„	1′	Nord-Amerika
van Houttei . . .	Hort.	van Houtt's „	„	„	2′	Hybr.
Wheeleri.	Sweet.	Wheeler's „	„	„	„	„
Platycodon . . .	A. D. C.	Breitglocke . .	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
grandiflorum . . . (Campanula „	A. D. C. Jacq.)	Grossblumige „	„	„	1′	Sibir., Daurien
Polemonium . . .	Diosc.	Sperrkraut . .	5, C. 1, O.	Polemoniaceæ		
coeruleum	L.	Blaues „	„	„	2′	Schwz., S.-Dtschl.
Polygonum . . .	L.	Knöterig . . .	8, C. 3, O.	Polygoneæ		
vaccinifolium . . .	Wall.	Heidelbeerblättr. „	„	„	¼′	Nord-Indien
Potentilla	Brunf.	Fingerkraut . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
atrosanguinea . . .	Lodd.	Dunkelblutroth. „	„	„	2′	Nepal
„ Russeliana . .	Bot. Mag.	Russel's „ „	„	„	„	Hybr.
Mac-Nabiana . . .	Paxt.	Mac-Nab's „	„	„	2—3′	„
Menziessii	Hort.	Menzie's „	„	„	2′	„
nepalensis	Hook.	Nepalsches „	„	„	„	Nepal
(colorata	Lehm.)					
(formosa	Don.)					
Tormentilla Tongui .	Hort.	Tongui „	„	„	¼′	Hybr.
Primula	Matth.	Primel	5, C. 1, O.	Primulaceæ		
Auricula hortensis .	L.	Gartenaurikel . .	„	„	¼′	(Europ. Alpen)
elatior hortensis . .	L.	Gartenprimel . .	„	„	„	(Deutschland)
farinosa	L.	Mehlige „	„	„	„	Deutschland
helvetica	Lodd.	Schweizer „	„	„	„	Schweiz
marginata	Curt.	Geränderte „	„	„	„	Mittel-Europa
Pallasii	Lehm.	Pallas' „	„	„	¼′	Altai, Sibirien

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Ptarmica	Tourn.	Dorant	19, C. 2, O.	Compositæ		
vulgaris fl. pl. . . .	D. C.	Gef. gemeiner „	„	„	2′	(Deutschland)
(Achill. Ptarmica fl. pl.	L.)					
Pulmonaria . . .	Plin.	Lungenkraut. .	5, C. 1, O.	Boragineæ		
azurea	Bess.	Azurblaues „	„	„	½′	Gallizien, Ungarn
mollis	Wulf.	Weiches „	„	„	1′	Süd-Deutschl.
officinalis maculata .	L.	Gefleckte gem. „	„	„	½′	(Deutschland)
Pyrethrum	Gärt.	Bertramwurz. .	19, C. 2, O.	Compositæ		
corymbosum . . .	W.	Doldentraubige „	„	„	3′	Kaukasus, Sibir.
roseum	Bieb.	Rosenrothe „	„	„	3′	Kaukasus, Pers.
serotinum	W.	Spätblühende „	„	„	5′	Nord-Amerika
sinense fl. pl. variet.	Sab.	Gef. chinesische „	„	„	2—4′	China
Ranunculus . . .	Plin.	Hahnenfuss . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
acris fl. pl.	L.	Gef. scharfer „	„	„	1—2′	(Deutschland)
illyricus	L.	Illyrischer „	„	„	„	Illyr., Oestreich,
reptans fl. pl. . . .	L.	Gef. kriechender „	„	„	1′	(Deutschland)
Rhaponticum . .	D. C.	Rhaponticum .	19, C. 1, O.	Compositæ		
pulchrum	Fisch. et Mey.	Schönes „	„	„	1½′	Kaukasus
Rudbeckia	Cass.	Rudbeckie. . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
laciniata	L.	Schlitzblättrige „	„	„	6—7′	Virgin., Canada
speciosa	Wender.	Prächtige „	„	„	1½′	Nord-Amerika
Sanguisorba . . .	Fuchs.	Wiesenknopf .	4, C. 1, O.	Rosaceæ		
media	L.	Mittlerer „	„	„	3′	Nord-Amerika
Saxifraga	Diosc.	Steinbrech . .	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
Cotyledon	L.	Nabelkrautart. „	„	„	1′	Schwz., Eur., Alp.
crassifolia	L.	Dickblättriger „	„	„	1′	Sibirien
hirsuta punctata . .	Ser.	Punctirt. rauher „	„	„	½′	„
Scabiosa	Vaill.	Scabiose . . .	4, C. 1, O.	Dipsaceæ		
australis	Wulf.	Südliche „	„	„	2—2½′	Steierm., Krain
lucida	Vill.	Glänzende „	„	„	2—3′	Frankreich
Scilla	Theoph.	Meerzwiebel . .	6, C. 1, O.	Asphodeleæ		
amoena	L.	Schöne „	„	„	½′	Mittel- u. S.-Eur.
campanulata . . .	Ait.	Glockenblüthige „	„	„	1′	Span., Portugal
(Agraphis „	Lk.)					
sibirica	Andr.	Sibirische „	„	„	½′	Sibirien
Scolopendrium . .	Sm.	Bandfarren . .	24, C. 1, S.	Filices		
officinarum crispum .	Sm.	Krauser „	„	„	½′	(Deutschland)
Sedum	Plin.	Sedum, (Fetthenne) . .	10, C. 4, O.	Crassulaceæ		
Aizoon	L.	Gelbes „	„	„	1′	Sibirien
spurium	Bieb.	Bastard „	„	„	¼′	Kaukasus
Telephium purpureum	Koch.	Purpurrothes „	„	„	1½′	(Europa)
Senecio	L.	Kreuzkraut . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
sarracenicus . . .	Jacq.	Heidnisches „	„	„	5—6′	Engl. Frkr. Schw. Deutschl., Sibir.
Serratula	L.	Scharte	19, C. 1, O.	Compositæ		
coronata	L.	Gekrönte „	„	„	5—6′	Sibirien, Italien
radiata	Bieb.	Strahlenblüthige „	„	„	2—3′	Kaukas., Ungarn
Silphium	L.	Silphie	19, C. 4, O.	Compositæ		
Hornemanni . . .	Schrad.	Hornemann's „	„	„	5—6′	Nord-Amerika
laciniatum	L.	Geschlitztblättr. „	„	„	6—8′	„
trifoliatum	L.	Dreiblättrige „	„	„	5—6′	Virginien, Carol.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Solidago.	L.	Goldruthe . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
altissima	L.	Höchste „	„	„	5—6'	Nord-Amerika
ambigua . . , . .	Ait.	Zweifelhafte „	„	„	2—3'	„
arguta	Ait.	Scharfgesägte „	„	„	2—3'	„
caesia	L.	Blassblaustengl. „	„	„	3'	„
canadensis	L.	Canadische „	„	„	3—4'	Virgin., Canada
„ longiracemosa .	D. C.	Langtraubige „ „	„	„	3'	
graminifolia. . . .	Ell.	Grasblättrige „	„	„	„	Canada, Pensylv.
longifolia	Schrad.	Langblättrige „	„	„	5—6'	Nord-Amerika
procera	Ait.	Hohe „	„	„	„	„
Spiraea	Theoph.	Spierstaude . .	12, C. 5, O.	Rosaceæ		
Aruncus	L.	Bocksbärtige „	„	„	4—5'	Süd-Deutschl.
digitata	W.	Fingerblättrige „	„	„	2'	Sibirien
Filipendula fl. pl.. .	L.	Gef. knollige „	„	„	„	(Süd-Deutschl.)
lobata.	Murr.	Gelappte „	„	„	1½'	Nord-Amerika
„ venusta . . .	Hort.	Anmuthige „ „	„	„	„	
Ulmaria fl. pl.. . .	L.	Gef. Sumpf „	„	„	3—4'	(Deutschland)
Statice	Dalech.	Widerstoss . .	5, C. 1, O.	Plumbagineæ		
Gmelini	W.	Gmelin's „	„	„	2'	Sibirien
latifolia	Sm.	Breitblättriger „	„	„	1½'	Kaukasus
Stipa	L.	Pfriemengras .	3, C. 2, O.	Gramineæ		
pennata	L.	Federartiges „	„	„	1½'	Deutschl. Frankr.
Telekia	Baumg.	Telekie	19, C. 2, O.	Compositæ		
cordifolia	Kit.	Herzblättrige „	„	„	5—6'	Ungarn, Böhmen, Süd-Krain
Thalictrum . . .	Diosc.	Wiesenraute . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
aquilegifolium atropurpureum . .	Murr.	Dunkelpurpurrothe akeleyblättrige „	„	„	3—4'	Schwz., S.-Dschl.
glaucum	Desf.	Graugrüne „	„	„	„	Span., Portugal
(speciosum	Poir.)					
tuberosum	L.	Knollige „	„	„	1—1½'	Span., Pyrenäen
Thermopsis . . .	R. Br.	Fuchsbohne . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
fabacea	D. C.	Bohnenartige „	„	„	2—3'	Nord-Amerika
Tradescantia. . .	Rupp.	Tradescantie .	6, C. 1, O.	Commelineæ		
virginica	L.	Virginische „	„	„	1½'	Virginien
Trollius	C. Gesn.	Trollblume . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
asiaticus	L.	Asiatische „	„	„	1½'	Sibirien
europaeus	L.	Europäische „	„	„	„	Deutschland
Tulipa.	C. Gesn.	Tulpe	6, C. 1, O.	Liliaceæ		
Gesneriana variet. .	L.	Verschiedenfarb. Garten „	„	„	1—2'	(Kleinas.) Hybr.
„ fl. pl. variet. .	—	Gefüllte „ „	„	„	„	Hybride
suaveolens	Roth.	Duftende „	„	„	½'	Süd-Europa
Uvularia.	L.	Traubenblume .	6, C. 1, O.	Melanthiaceæ		
grandiflora	Sm.	Grossblumige „	„	„	1—1½'	Nord-Amerika
Veratrum	Plin.	Germer	6, C. 3, O.	Melanthiaceæ		
nigrum	L.	Schwarzer „	„	„	4—5'	Süd-Deutschl.
Verbascum. . . .	Plin.	Wollkraut . . .	5, C. 1, O.	Personatæ		
phoeniceum. . . .	L.	Violettes „	„	„	3'	Ost-Europa
puniceum	Schrad.	Dunkelrothes „	„	„	3'	Mittel-Europa
Vernonia	Schreb.	Vernonie . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
novaeboracensis . .	W.	Neuyorkische „	„	„	6—7'	Carolina, Canada

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Veronica.	Fuchs.	Ehrenpreis . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
elatior.	Ehrh.	Hoher „	„	„	4'	Süd-Europa
gentianoides . . .	Vahl.	Enzianartiger „	„	„	1'	Kaukas.,Kleinas.
grandis	Fisch.	Grosser „	„	„	3'	Sibirien
latifolia	L.	Breitblättriger „	„	„	1'	Oestr., Schweiz
maritima carnea . .	(L.)	Fleischfarbiger Meerstrand's „	„	„	2'	(Europa)
saxatilis	L.	Stein „	„	„	1/4'	Alp.,S.-Deutschl.
sibirica	L.	Sibirischer „	„	„	4'	Sibirien
(Leptandra „	Sweet.)					
Teucrium	L.	Gamanderartig. „	„	„	1'	Süd-Deutschl.
virginica	L.	Virginischer „	„	„	4'	Virgin., Japan
(Leptandra „	Nutt.)					
„ alba . . .	—	Weisser „ „	„	„	3'	
Vinca	Plin.	Sinngrün . . .	5, C. 1, O.	Apocyneæ		
minor	L.	Kleines „	„	„	1/2'	Deutschland
Viola	Virg.	Veilchen . . .	5, C. 1, O.	Violariæ		
odorata	L.	Wohlriechendes „	„	„	1/4'	Deutschland
„ fl. pl.	—	Gefülltes „	„	„	„	
„ semperflorens .	Hort.	Immerblühendes „	„	„	„	

Knollengewächse.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Georgina	W.	Georgine . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
variabilis fl. pl. variet.	Desf.	Gef. veränderl. „	„	„	3—7'	Mexico
(Dahlia „	Cav.)					
Mirabilis	Parkins.	Wunderblume .	5, C. 1, O.	Nyctagineæ		
Jalapa	L.	Jalapa „	„	„	2—3'	O.-Ind., M.-Amer.
Oxalis	L.	Sauerklee . . .	10, C. 5, O.	Oxalideæ		
esculenta	Ott. et Diet.	Essbarer „	„	„	1/2'	Mexico
lasiandra.	Grah.	Haarfädiger „	„	„	3/4'	„

Bäume und Sträucher.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Abies	Tourn.	Tanne	21, C. 1, O.	Coniferæ		
Balsamea	Mill.	Balsam „	„	„	30—40′	Nord-Amerika
(Pinus „	L.)					
(Picea „	Don.)					
canadensis	Lk.	Canadische „	„	„	30—50′	Nord-Amerika
(Pinus „	L.)	(Hemlock's) „				
pectinata	D. C.	Edel (Weiss) „	„	„	100′	Süd-Deutschl.
(Pinus Picea	L.)					
(Picea pectinata	Loud.)					
Acer	Plin.	Ahorn	23, C. 1, O.	Acerineæ		
campestre	L.	Feld „	„	„	30—40′	Deutschland
colchicum rubrum	Hort.	Rother Kolchischer „	„	„	?	Kaukasus
monspessulanum	L.	Dreilappiger „	„	„	10—20′	S.-Eur.(S.-Dtchl.)
platanoides	L.	Spitz „	„	„	50—80′	Europa
Pseudoplatanus	L.	Weisser „	„	„	60—90′	„
„ fol. varieg.	—	Buntblättriger „	„	„		
rubrum	Michx.	Rother „	„	„	30—40′	Nord-Amerika
saccharinum	Michx.	Zucker „	„	„	30—50′	„
striatum	Lam.	Gestreifter „	„	„	10—20′	„
Aesculus	L.	Rosskastanie	7, C. 1, O.	Hippocastaneae		
Hippocastanum	L.	Gemeine „	„	„	50—80′	Nord-Indien
rubicunda	D. C.	Rothe „	„	„	40—60′	Nord-Amerika
Ailanthus	Desf.	Götterbaum	23, C. 1, O.	Terebinthaceae		
glandulosa	Desf.	Drüsiger „	„	„	15—20′	China
Alnus	Tourn.	Erle	21, C. 4, O.	Amentaceae		
glutinosa	W.	Gemeine „	„	„	50—70′	Deutschland
Ampelopsis	Michx.	Jungfernwein	5, C. 1, O.	Ampelideae		
hederacea	Michx.	Epheuartiger „	„	„	20—30′	Nord-Amerika
Amygdalus	Theoph.	Mandel	12, C. 1, O.	Rosaceæ		
nana	L.	Zwerg „	„	„	1—2′	Tartarei, Kalm.
Andrômeda	L.	Gränke, (Andromede)	10, C. 1, O.	Ericeæ		
polifolia rosmarinifolia	D. C.	Rosmarinblättr. „	„	„	1½′	Nord-Amerika
Aralia	L.	Aralie	5, C. 5, O.	Araliaceae		
spinosa	„	Dornige „	„	„	6—8′	Nord-Amerika
Aristolochia	L.	Osterluzei	20, C. 2, O.	Aristolochiae		
Sipho	Herit.	Grossblättrige „	„	„	10—15′	Nord-Amerika
Armeniaca	Tourn.	Aprikose	12, C. 1, O.	Rosaceae		
vulgaris	Lam.	Gemeine „	„	„	10—15′	Armenien
(Prunus Armeniaca	L.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Aronia	Pers.	Felsenmispel .	12, C. 4, O.	Rosaceæ		
Botryapium. . . .	Pers.	Canadische „	„	„	10—15′	Canada
(Amelanchier „	D. C.)					
(Pyrus „	L.)					
ovalis	Pers.	Ovalblättrige „	„	„	10—15′	„
(Amelanchier „	D. C.)					
(Pyrus „	W.)					
Azalea	Desv.	Felsenstrauch .	5, C. 1, O.	Rhodoreæ		
(Rhododendron . .	Don. et Torr.)					
glauca	Lam.	Graugrüner „	„	„	2—3′	Nord-Amerika
nitida	Pursh.	Glänzender „	„	„	„	„
nudiflora	L.	Nacktblüthiger „	„	„	„	„
„ rosea . . .	—	Rosenrother „ „	„	„	„	Hybr.
pontica	L.	Pontischer „	„	„	„	Armenien
„ alba . . .	—	Weisser „ „	„	„	„	Hybride
„ calendulacea	—	Ringelblumenfb. „	„	„	„	„
„ glauca . . .	—	Graugrüner „ „	„	„	„	„
speciosa	W.	Schöner „	„	„	„	Nord-Amerika
„ aurantia . .	—	Orangenfarbiger „	„	„	„	Hybride
viscosa	L.	Klebriger „	„	„	„	Nord-Amerika
Berberis.	Brunf.	Sauerdorn . .	6, C. 1, O.	Berberideæ		
dulcis	Sweet.	Süsser „	„	„	3—4′	Patagon., S.-Am.
vulgaris	L.	Gemeiner „	„	„	6—10′	Deutschland
„ atropurpurea	—	Braunrother „ „	„	„	?	
Betula.	L.	Birke	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
alba	„	Weisse „	„	„	50—80′	Deutschland
„ laciniata . . .	—	Geschlitzte „ „	„	„	?	
„ pendula . . .	—	Hängende „ „	„	„	50—80′	„
nana	L.	Zwerg „	„	„	2—3′	Süd-Deutschl.
Buxus	L.	Buxbaum . . .	21, C. 4, O.	Euphorbiaceæ		
sempervirens . . .	„	Gemeiner „	„	„	1—2′	S.-Eur., Orient
Calycanthus . . .	L.	Kelchblume . .	12, C. 6, O.	Calycantheæ		
floridus	„	Blumenreiche „	„	„	5—10′	Carolina
laevigatus	W.	Glatte „	„	„	4—8′	„
Caprifolium . . .	Tourn.	Geissblatt. . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
gratum	Pursh.	Angenehmes „	„	„	10—15′	Virginien
italicum	R. et Sch.	Italienisches „	„	„	10—20′	M.-Eur., S.-Dschl.
(Lonicera Caprifolium	L.)					
pubescens	Hook.	Weichhaariges „	„	„	8—10′	Nord-Amerika
(Lonicera Goldii . .	Spr.)					
sempervirens . . .	Mich.	Immergrünes „	„	„	10—20′	Carolina, Mexico
Caragana	Lam.	Caragane . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
arborescens	Lam.	Baumartige „	„	„	10—20′	Sibirien
(Robinia Caragana .	L.)	(Sibir. Erbsenstr.)				
pygmaea.	D. C.	Zwerg „	„	„	2—3′	Sibirien, Daurien
„ pendula . .	—	Hängende „ „	„	„		
Carpinus	L.	Hainbuche. . .	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
Betulus	L.	Gemeine „	„	„	20—30′	Deutschland
„ incisa . . .	—	Geschlitzte „ „	„	„	5—10′	
Cassandra	D. Don.	Cassandra . . .	10, C. 1, O.	Ericeæ		
calyculata	G. et D. Don.	Gekelchte „	„	„	1—2′	Nord-Amerika (Ost-Preussen)
(Andromeda „	L.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Ceanothus	L.	Seckelblume. .	5, C. 1, O.	Rhamneæ		
americanus	L.	Amerikanische „	„	„	2—3′	Nord-Amerika
Celtis	Tourn.	Zürgelbaum . .	5, C. 2, O.	Ulmaceæ		
australis	L.	Gemeiner „	„	„	15—20′	Süd-Europa (Krain, Steierm.
Cephalanthus . .	L.	Kopfblume . .	4, C. 1, O.	Rubiaceæ		
occidentalis	„	Abendländische „	„	„	6—8′	Nord-Amerika
Cerasus	Juss.	Kirsche	12, C. 1, O.	Rosaceæ		
acida fl. pleno . .	Ehrh.	Gef. Sauer „	„	„	15—20′	(Orient, Dtschl.)
(Prunus Cerasus . .	L.)					
Laurocerasus . . .	Lois.	Kirschlorbeer . .	„	„	6—8′	Klein-Asien
(Prunus „	L.)					
Padus.	D. C.	Trauben „	„	„	20—30′	Deutschland
(Prunus „	L.)					
„ pendula . .	—	Hängende „ „	„	„	„	
serotina	Lois.	Späte „	„	„	15—25′	Nord-Amerika
(Prunus virginiana .	Mill.)					
Chionanthus . . .	L.	Schneeblume. .	2, C. 1, O.	Oleineæ		
virginica	„	Virginische „	„	„	4—6′	Virginien
Clematis	Diosc.	Waldrebe . . .	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
Vitalba	L.	Gemeine „	„	„	10—20′	Deutschland
Viticella	„	Italienische „	„	„	„	Süd-Europa
Clethra	L.	Clethra	10, C. 1, O.	Ericeæ		
alnifolia	„	Erlenblättrige „	„	„	3—5′	Nord-Amerika
Colutea	L.	Blasenstrauch .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
arborescens	„	Baumartiger „	„	„	5—7′	Ital., S.-Deutschl.
orientalis	Lam.	Morgenländisch. „	„	„	5—6′	Italien, Orient
Comptonia	Banks.	Comptonie . .	21, C. 3, O.	Amentaceæ		
asplenifolia	Bks.	Bandfarrenblätt. „	„	„	3—4′	Nord-Amerika
Cornus	Virg.	Hartriegel. . .	4, C. 1, O.	Cornaceæ		
alba	L.	Weisser „	„	„	6—10′	Nord-Amerika
„ sibirica . . .	Lodd.	Sibirischer „	„	„	„	Sibirien
florida	L.	Schönblühender „	„	„	10—15′	Nord-Amerika
paniculata	Herit.	Rispenblüthiger „	„	„	5—6′	„
(racemosa	D. C.)					
sanguinea	L.	Blutrother „	„	„	6—10′	Europa, N.-Amer.
Coronilla	L.	Peltsche (Kronwicke) . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
Emerus	„	Angenehme „	„	„	3—4′	Süd-Europa
Corylus	L.	Hasel	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
Avellana	„	Gemeiner „	„	„	10—15′	Deutschland
„ fol. atropurpureis	—	Schwarzrother „ „	„	„	„	
Cotoneaster . . .	Medik.	Quittenmispel .	12, C. 2, O.	Rosaceæ		
vulgaris	Lindl.	Gemeine „	„	„	3—4′	Europa, Sibirien (Süd-Deutschl.)
(Mespilus Cotoneaster	L.)					
Crataegus	Tourn.	Weissdorn (Hagedorn) . . .	12, C. 4, O.	Rosaceæ		
coccinea	L.	Scharlachrother „	„	„	10—15′	Nord-Amerika
cordata	Mill.	Herzförmiger „	„	„	„	Canada, Virgin.
Crus galli	L.	Hahnensporn „	„	„	„	Nord-Amerika
Oxyacantha . . .	L.	Gemeiner „	„	„	10—20′	Deutschland
„ fl. pleno . . .	—	Gefüllter „ „	„	„	10—15′	
„ fl. rubro . . .	—	Rother „ „	„	„	„	

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Crataegus						
Oxyac. fl. rubro pleno	—	Rothgefüllter „ „	12, C. 4, O.	Rosaceæ	10—15′	
„ „ „ splendens .	—	Rothglänzend. „ „	„	„	„	
Pyracantha	Pers.	Immergrüner „	„	„	5—7′	Frankr., Italien
tanacetifolia . . .	Pers.	Rainfarrenblättr. „	„	„	6—10′	Orient
Cupressus	L.	Cypresse . . .	21, C. 8, O.	Coniferæ		
thyoides	L.	Lebensbaum „	„	„	12—16′	Nord-Amerika
(Thuja sphaeroidea .	Rich.)	(Weisse Ceder)				
(Chamaecyparus „	Spach.)					
Cydonia	Tourn.	Quittenbaum. .	12, C. 5, O.	Rosaceæ		
japonica	Pers.	Japanischer „	„	„	3—6′	Japan
(Pyrus „	Thb.)					
Cytisus	L.	Bohnenbaum. .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
alpinus	Schm.	Alpen „	„	„	10—20′	Krain, Süd-Tyrol
„ pendulus . .	—	Hängender „ „	„	„		
capitatus	Jacq.	Kopfblüthiger „	„	„	1—2′	Ital., Mähr., Tyrol
elongatus	Kit.	Langästiger „	„	„	3—5′	Ungarn
Laburnum	L.	Gemeiner „	„	„	10—15′	Schw. Kr. N.-Östr.
„ purpurascens .	—	Purpurröthlich. „ „	„	„	„	Hybr.
„ quercifolium . .	—	Eichenblättrig. „ „	„	„	„	„
nigricans	L.	Schwärzlicher „	„	„	3—5′	Ital., S.-Deutschl.
purpureus	Scop.	Purpurrother „	„	„	½—1′	Krain, Süd-Tyrol
sessilifolius	L.	Sitzendblättriger „	„	„	4—6′	Ital., Süd-Tyrol
Daphne	Diosc.	Seidelbast. . .	8, C. 1, O.	Thymeleæ		
Cneorum	L.	Steinröschen „	„	„	¼—½′	Süd-Deutschl.
Deutzia	Thb.	Deutzie	10, C. 3, O.	Philadelpheae		
gracilis	Sieb. et Zucc.	Schlanke „	„	„	1—1½′	Japan, N.-China
pulchella	Hort.	Schöne „	„	„	3—4′	?
scabra	Thb.	Scharfe „	„	„	4—5′	Japan
Diervilla	Tourn.	Dierville . . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
amabilis	Carr.	Angenehme „	„	„	3—5′	Japan
(Weigelia „	v. Houtt.)					
canadensis	W.	Canadische „	„	„	1—2′	Nord-Amerika
japonica	D. C.	Japanische „	„	„	3—5′	Japan
(Weigelia rosea . .	Lindl.)					
Elaeagnus	Tourn.	Oleaster. . . .	4, C. 1, O.	Elaeagneae		
macrophylla . . .	Thb.	Grossblättriger „	„	„	7—10′	Japan
Evonymus	Theoph.	Spindelbaum. .	5, C. 1, O.	Celastrineae		
angustifolius . . .	Pursh.	Schmalblättriger „	„	„	2—3′	Nord-Amerika
europaeus	L.	Gemeiner „	„	„	10—15′	Deutschland
latifolius	L.	Breitblättriger „	„	„	7—10′	Süd-Deutschl.
verrucosus	Scop.	Warziger „	„	„	5—8′	„
Fagus	L.	Buche	21, C. 7, O.	Amentaceae		
sylvat. atropurpurea .	(L.)	Schwarzrothe „	„	„	30—40′	(Deutschland)
„ fol. varieg. . .	—	Buntblättrige „	„	„	10—15′	
Forsythia	Vahl.	Forsythie . . .	2, C. 1, O.	Jasmineæ		
viridissima	Lindl.	Dunkelgrüne „	„	„	4—6′	Nord-China
Fraxinus	Virg.	Esche	23, C. 2, O.	Oleineae		
excelsior	L.	Gemeine „	„	„	50—70′	Deutschland
„ pendula . . .	Ait.	Hängende „ „	„	„		
heterophylla . . .	Vahl.	Verschiedenblät. „	„	„	30—40′	Nord-Amerika
(simplicifolia . . .	W.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Fraxinus						
lentiscifolia pendula .	(Desf.)	Hängende mastixblättrige „	23, C. 2, O.	Oleineae	—	(F. lentiscifolia in Aleppo)
pubescens	Walt.	Weichhaarige „	„	„	20—30′	Nord-Amerika
(pensylvanica . . .	Marsh.)					
Genista	L.	Ginster	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
radiata	Scop.	Strahlblättriger „	„	„	1—2′	Kärnthen, Italien
(Spartium „	L.)					
Glyptostrobus . .	Endl.	Grübchenzapfen	21, C. 8, O.	Coniferæ		
pendulus	Endl.	Hängender „	„	„	5—10′	China
(Taxodium sinense pendulum . . .	Hort.)					
Gymnocladus . .	Lam.	Chicot, (Schusserbaum) . . .	22, C. 9, O.	Leguminosæ		
canadensis	Lam.	Canadischer „	„	„	10—15′	Canada
Halesia	L.	Halesie	11, C. 1, O.	Styraceæ		
tetraptera	L.	Vierflügliche „	„	„	10—15′	Carolina, Florida
Halimodendron . .	Fisch.	Salzstrauch . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
argenteum	D. C.	Silberweisser „	„	„	4—6′	Sibirien
(Robinia Halodendron	L.)					
Hedera	Virg.	Epheu	5, C. 1, O.	Araliaceæ		
algeriensis	Hort.	Algierischer „	„	„	10—15′	Algier
colchica	C. Koch	Kolchischer „	„	„	„	Kaukasus
(Roegneriana . . .	Hort.)					
Helix	L.	Gemeiner „	„	„	20—30′	Deutschland
„ arborescens . .	—	Baumartiger „ „	„	„		
„ hibernica . . .	Hort.	Irländischer „ „	„	„	„	Irland
„ palmata . . .	—	Handförmiger „ „	„	„		
Hydrangêa . . .	Cronov.	Wasserstrauch.	10, C. 2, O.	Saxifrageæ		
arborescens	L.	Baumartiger „	„	„	3—4′	Virginien
nivea	Mx.	Schneeweisser „	„	„	2—3′	Carolina
Hypericum	Diosc.	Hartheu	18, C. 4, O.	Hypericineae		
calycinum	L.	Grossblumiges „	„	„	1′	Griechenland
elatum	Ait.	Hohes „	„	„	2—3′	Nord-Amerika
Kalmianum	L.	Kalm's „	„	„	2—3′	Virginien
Jasminum	L.	Jasmin	2, C. 1, O.	Jasmineæ		
officinale	L.	Gemeiner „	„	„	3—5′	O.-Ind., Levante
Ilex	Lonic.	Hülse	4, C. 4, O.	Celastrineæ		
Aquifolium	L.	Gemeine „	„	„	10—15′	Europa
Juniperus	L.	Wachholder . .	22, C. 13, O.	Coniferæ		
communis vart. suecica	Mart.	Schwedischer „	„	„	5—8′	Schweden
virginiana	L.	Virginischer „ (Virgin. Ceder)	„	„	10—15′	Nord-Amerika
Kalmia	L.	Kalmie	10, C. 1, O.	Ericeæ		
angustifolia	L.	Schmalblättrige „	„	„	1—2′	Nord-Amerika
„ rubra . . .	—	Rothe „ „	„	„	1′	
latifolia	L.	Breitblättrige „	„	„	1—2′	Pensylv., Virgin.
Keria	D. C.	Kerie	12, C. 5, O.	Rosaceae		
japonica	D. C.	Japanische „	„	„	3—4′	Japan
(Corchorus „	Thb.)					
Koelreuteria . . .	Laxm.	Koelreuterie . .	8, C. 1, O.	Sapindeæ		
paniculata	Laxm.	Rispenblüthige „	„	„	8—12′	China

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Larix	Tourn.	Lärche	21, C. 1, O.	Coniferæ		
europaea pendula .	Ait.	Hängende europ. „	„	„	20—30′	Nord-Amerika
(Pinus Larix pendula	L.)					
Ledum.	Lob.	Porst	10, C. 1, O.	Ericeæ		
latifolium	Ait.	Breitblättriger „	„	„	1—2′	Nord-Amerika
Leiophyllum . . .	Pers.	Glattblatt, (Sand-myrte) . . .	10, C. 1, O.	Ericeæ		
buxifolium	Ell.	Buxbaumblättr. „	„	„	½′	Nord-Amerika
(Ammyrsine „	Pursh.)					
Ligustrum	Virg.	Rainweide . . .	2, C. 1, O.	Oleineæ		
vulgare	L.	Gemeine „	„	„	6—10′	Deutschland
Liriodendron . ,	L.	Tulpenbaum . .	13, C. 6, O.	Magnoliaceæ		
Tulipifera	L.	Gemeiner „	„	„	30—50′	Nord-Amerika
Lonicêra.	L.	Heckenkirsche.	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
alpigena	L.	Alpen „	„	„	4—6′	Süd-Deutschl.
coerulea	L.	Blaue „	„	„	„	„
Ledebourii	Esch.	Ledebour's „	„	„	„	Californien
tatarica	L.	Tartarische „	„	„	8—12′	Tartarei
„ rubra	—	Rothe „ „	„	„	„	
Xylosteum	L.	Gemeine „	„	„	„	Deutschland
Magnolia	Plum.	Magnolie . . .	13, C. 6, O.	Magnoliaceæ		
obovata	Thb.	Rothe „	„	„	5—6′	Japan
(purpurea	Curt.)					
Mahonia.	Nutt.	Mahonie. . . .	6, C. 1, O.	Berberideæ		
aquifolium	Nutt.	Hülsenblättrige „	„	„	1—5′	Nord-Amerika
(Berberis „	Pursh.)					
Negundo.	Moench.	Ahorn.	22, C. 5, O.	Acerineae		
fraxinifolium . . .	Nutt.	Eschenblättriger „	„	„	30—50′	Nord-Amerika
(Acer Negundo . .	L.)					
Ornus	Pers.	Blüth-Esche . .	2, C. 1, O.	Oleineæ		
europaea.	Pers.	Europäische „	„	„	15—20′	Krain, S.-Tyrol
(Fraxinus Ornus . .	L.)					
Paeonia	Diosc.	Paeonie, (Gicht-rose) . . .	13, C. 2, O.	Ranunculaceæ		
Moutan	Sims.	Chinesische „	„	„	2—3′	China
„ van Houttei .	Casor.	van Houtt's „ „	„	„	„	Hybride
Pavia	Boerh.	Pavie	7, C. 1, O.	Hippocastaneæ		
macrostachia . . .	Lois.	Grossährige „	„	„	5—6′	Nord-Amerika
(Aesculus „ . .	Mx.)					
Philadelphus . .	Rupp.	Pfeifenstrauch.	12, C. 1, O.	Philadelpheæ		
coronarius	L.	Bekränzter „	„	„	5—8′	Süd-Europa (Süd-Deutschl.)
„ fl. pleno . . .	—	Gefüllter „ „	„	„	„	
„ vart. nana . .	—	Niedriger „ „	„	„	1—2′	
floribundus	Schrad.	Vielblumiger „	„	„	4—6′	Nord-Amerika
Gordonianus . . .	Lindl.	Gordon's „	„	„	8—10′	„
grandiflorus. . . .	W.	Grossblumiger „	„	„	6—8′	„
hirsutus	Nutt.	Rauhaariger „	„	„	4—5′	„
„ gracilis . . .	Schrad.	Dünner „ „	„	„	3—4′	
inodorus	L.	Geruchloser „	„	„	6—8′	„
latifolius	Schrad.	Breitblättriger „	„	„	8—10′	„
laxus	Schrad.	Schlaffer „	„	„	4—5′	„
Ledebourii	Hort.	Ledebour's „	„	„	3—4′	?

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Philadelphus						
speciosus	Schrad.	Prächtiger „	12, C. 1, O.	Philadelpheae	8—10′	Nord-Amerika
Zeiheri	Schrad.	Zeiher's „	„	„	5—6′	„
Picea	D. Don.	Fichte	21, C. 1, O.	Coniferæ		
alba	Lk.	Weisse „	„	„	30—40′	Nord-Amerika
(Pinus „	L.)					
(Abies „	Mchx.)					
vulgaris	Lk.	Rothe „	„	„	80—100′	Deutschland
(Pinus Abies . . .	L.)					
(Abies excelsa. . .	D. C.)					
Pinus	L.	Kiefer	21, C. 1, O.	Coniferæ		
Cembra	„	Zürbel „	„	„	20—30′	Süd-Deutschl.
Strobus	„	Weimouth's „	„	„	40—50′	Nord-Amerika
Platanus.	Tourn.	Platane	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
occidentalis	L.	Abendländische „	„	„	40—50′	Nord-Amerika
Populus	L.	Pappel	22, C. 7, O.	Amentaceæ		
alba	„	Silber „	„	„	60—80′	Deutschland
balsamifera	„	Balsam „	„	„	20—30′	Nord-Amerika
„ suaveolens .		Duftende „ „	„	„	„	
candicans	Ait.	Weissliche „	„	„	40—50′	„
(ontariensis	Desf.)					
(macrophylla . . .	Lindl.)					
laurifolia	Ledeb.	Lorbeerblättrige „	„	„	30—50′	Sibirien
monilifera	Ait.	Canadische „	„	„	60—80′	Nord-Amerika
nigra	L.	Schwarze „	„	„	„	Deutschland
pyramidalis	Moench.	Italienische „	„	„	„	Italien
(dilatata	Ait.)					
(fastigiata	Desf.)					
tremula pendula . .	(L.)	Hängende Zitter „ (Espe)	„	„		(Europa)
Potentilla.	L.	Fingerkraut . .	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
fruticosa	L.	Strauchartiges „	„	„	2—3′	Pyrenäen, Sibir.
Prinos.	Gronov.	Winterbeere. .	6, C. 1, O.	Celastrineæ		
glaber	L.	Glatte „	„	„	3—4′	Nord-Amerika
Ptelea.	L.	Lederbaum . .	4, C. 1, O.	Terebinthaceae		
trifoliata	L.	Dreiblättriger „	„	„	7—10′	Nord-Amerika
Pyrus	Plin.	Birne, Apfel . .	12, C. 5, O.	Rosaceæ		
baccata	L.	Beerentragend. A.	„	„	8—12′	Sibirien
coronaria	Ait.	Wohlriechend. A.	„	„	6—10′	Virginien
prunifolia	(W.)	Scharlachfrcht. A.	„	„	5—10′	(Sibirien)
fructu coccineo . . .	—	(Sibir. Holz-Apfel)				
spectabilis	Ait.	Ansehnlicher A. (Gefüllter A.)	„	„	6—10′	China
Quercus	L.	Eiche	21, C. 7, O.	Amentaceæ		
coccinea	Wang.	Scharlach „	„	„	30—50′	Nord-Amerika
pedunculata . . .	W.	Stiel „	„	„	50—70′	Deutschland
„ fol. varieg. .	—	Bunte „ „	„	„	20—30′	
„ pendula . .	—	Hängende „ „	„	„	?	
Rhamnus.	Nicand.	Wegedorn . . .	5, C. 1, O.	Rhamneæ		
catharticus	L.	Gemeiner „	„	„	10—15′	Deutschland
Rhododendron . .	L.	Alpenrose . . .	10, C. 1, O.	Rhodoreæ		
catawbiense . . .	Mx.	Catawbische „	„	„	3—4′	Virgin., N.-Carol.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rhododendron						
maximum	L.	Grösste „	10, C. 1, O.	Rhodoreæ	2—3′	Canada, Carolina
ponticum.	L.	Pontische „	„	„	4—5′	Levante, Armen.
„ albidum	—	Weissliche „ „	„	„	„	
„ glomeratum . . .	—	Geknaulte „ „	„	„	2—3′	
„ roseum	—	Rosenrothe „ „	„	„	3—4′	
„ undulatum . . .	—	Wellenblättr. „ „	„	„	2—3′	
Rhodora	Duham.	Rhodora, (Sumpf-rose) . . .	10, C. 1, O.	Rhodoreæ		
canadensis	L.	Canadische „	„	„	1—2′	Canada
(Rhododend. Rhodora	G. Don.)					
Rhus	Theoph.	Sumach	5, C. 3, O.	Terebinthaceæ		
Cotinus	L.	Perrücken „	„	„	5—8′	Italien, Sibirien
glabra elegans . .	Ait.	Schöner glatter „	„	„	8—10′	Carolina
Ribes	Fuchs.	Johannisbeere .	5, C. 1, O.	Grossularieæ		
alpinum	L.	Alpen „	„	„	3—5′	Süd-Deutschl.
aureum	Pursh.	Goldgelbe „	„	„	„	Nord-Amerika
floridum	Herit.	Blumenreiche „	„	„	3—4′	„
glaciale	Wall.	Eis „	„	„	„	Nepal
glandulosum . . .	R. et P.	Drüsige „	„	„	4—5′	Chile
Gordonianum . . .	Hort.	Gordon's „	„	„	3—4′	Hybr.
(Beatonii.	Hort.)					
multiflorum	Kit.	Vielblumige „	„	„	„	Kroatien
petraeum	L.	Felsen „	„	„	5—6′	Kärnthen, Schles.
rubrum	L.	Rothe „	„	„	4—5′	Deutschland
sanguineum	Pursh.	Blutrothe „	„	„	„	Nord-Amerika (am Columbiaflusse
„ fl. pleno . . .	—	Gefüllte „ „	„	„	3—4′	
„ fl. albo . . .	—	Weisse „ „	„	„	„	
Robinia	L.	Robinie, (Schotendorn) . . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
dubia	Fouc.	Zweifelhafte „	„	„	20—25′	Hybr.
hispida	L.	Steifborstige „	„	„	5—6′	Virgin., Carolina
Pseudacacia . . .	L.	Gemeine „	„	„	30—50′	Nord-Amerika
„ sophoraefolia .	—	Sophorablättrige „	„	„	20—30′	
viscosa	Vent.	Klebrige „	„	„	25—30′	Nord-Amerika
Rosa	Varr.	Rose	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
alba carnea. . . .	—	Fleischfarbige weisse „	„	„	5—6′	Hybride
„ „ minor . .	—	Kleine „ „ „	„	„	4—5′	„
„ cœlestis	—	Bläuliche „ „	„	„	3—4′	„
„ fl. pleno	L.	Gefüllte „ „	„	„	5—8′	„
„ Princesse de Lamballe	—	Prinzess von Lamballe's „ „	„	„	2—3′	„
„ Regina Daniae .	—	Kön. v. Dänem. „ „	„	„	3—4′	„
alpina Boursaulti. .	Hort.	Boursault's Alpen „	„	„	10—15′	(Rosa alpina, S. D.) Hybr.
„ „ carnea pl.. .	—	Gef. fleischfarbige „ „ „	„	„	„	„
„ „ crimson . .	—	Kermesinr. „ „ „	„	„	„	„
„ „ elegans. . .	—	Schöne „ „ „	„	„	„	„
„ „ gracilis . .	—	Schlanke „ „ „	„	„	„	„
„ „ purpurea . .	—	Purpurrothe „ „ „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
centifolia alba pleno	—	Weissgef. centif. „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	2—3′	Hybr.
„ Guirlande . . .	—	Guirlanden „ „	„	„	5—6′	„
„ major	—	Grosse „ „	„	„	5—7′	(Persien)
„ minima	—	Kleinste „ „	„	„	1′	Hybr.
„ minor	—	Kleine „ „	„	„	2—3′	„
„ speciosa	—	Prächtige „ „	„	„	3—4′	„
„ muscosa pl. . . .	Ser.	Gef. Moos „ „	„	„	3—5′	„
„ „ perpetuélle . .	—	Langblühende „ „	„	„	2—3′	„
„ „ Princesse Adélaide . . .	Laff.	Prinz. Adelaid. „ „	„	„	5—6′	„
damascena belle Auguste . . .	—	Schöne Augusten damascener „	„	„	3—4′	(R. damascena, Syr.) Hybr.
„ blanche fleur . .	—	Weissblumige „ „	„	„	„	„
„ bonne Louise . .	—	Hofmeist.Louis. „ „	„	„	„	„
„ bouquet charmant .	—	Reiz. Bouquet „ „	„	„	„	„
„ Clorinde	—	Clorinden's „ „	„	„	„	„
„ Descemet. . . .	—	Descemet's „ „	„	„	„	„
„ Duchesse d'Angouleme	—	Herzogin von Angouleme „ „	„	„	„	„
„ „ de Berry . . .	—	Herz. v. Berry's „ „	„	„	„	„
„ Fanny Bias . . .	—	Fanny Bias' „ „	„	„	„	„
„ „ Parrisot . . .	—	Fan. Parrisot's „ „	„	„	„	„
„ Félicite perpétuelle	—	Immerblühende Glückseligk. „ „	„	„	„	„
„ grand Souveraine .	—	Gr. Regenten „ „	„	„	„	„
„ „ Sultan	—	Gr. Sultan „ „	„	„	„	„
„ Jean Bart . . .	—	Johann's Bart's „ „	„	„	„	„
„ La ville de Londres	—	Stadt London's „ „	„	„	„	„
„ Imperatrice de France	—	Kaiserin der Franzosen „ „	„	„	„	„
„ l'Infante	—	Infanten „ „	„	„	„	„
„ Lee	—	Lee's „ „	„	„	„	„
„ „ rubra	—	Lee's rothe „ „	„	„	„	„
„ Loisiel	—	Loisiel's „ „	„	„	„	„
„ Mad. Hardy . . .	—	Frau Hardy's „ „	„	„	„	„
„ „ Soêtmans . .	—	Fr. Soêtmans' „ „	„	„	„	„
„ magnifique . . .	—	Prächtige „ „	„	„	„	„
„ Marie Louise . .	—	Marie Louisen's „ „	„	„	„	„
„ Miroire des Dames .	—	Damenspiegel „ „	„	„	„	„
„ monstrueuse . .	—	Monströse „ „	„	„	„	„
„ Odette de Champdiver	—	Odette v. Champdiver's „ „	„	„	„	„
„ Oeillet parfait . .	—	Vollk. Nelken „ „	„	„	„	„
„ Ornement de Carafe	—	Caraffinenschm. „ „	„	„	„	„
„ Pomponia . . .	Lindl.	Geschmückte „ „	„	„	„	„
„ Prince d'Aremberg	—	Prinz d'Aremb. „ „	„	„	„	„
„ Princesse Amélie .	—	Pr. Amalien's „ „	„	„	„	„
„ Sophie	—	Sophie's „ „	„	„	„	„
„ sourdon double .	—	Doppelherz „ „	„	„	„	„
„ unique admirable .	—	Einzigschöne „ „	„	„	„	„
„ Valentine panaché	—	Val. gestreifte „ „	„	„	„	„
„ Véturie	—	Véturie's „ „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
dam. Vibert . . .	—	Vibert's „ „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	3—4'	Hybr.
„ Ypsilanti . . .	—	Ypsilanti's „ „	„	„	„	„
Fortunes double yellow	Hort.	Fortunes doppelte gelbe „	„	„	5—10'	China
gallica Arethusa . .	—	Arethusa's franz. „ (Provinz R.)	„	„	3—4'	Hybr.
„ belle Rosine. . .	—	Schöne Rosin. „ „	„	„	„	„
„ Cerise superbe . .	—	Prächt. kirschr. „ „	„	„	„	„
„ Champion . . .	—	Kämpfer „ „	„	„	„	„
„ Claude de Cressac	—	Claudius von Cressac's „ „	„	„	„	„
„ Enchantress . . .	—	Zauberin „ „	„	„	„	„
„ Eulalie.	—	Eulalien's „ „	„	„	„	„
„ feu d'Amour . .	—	Feuer der Liebe „ „	„	„	„	„
„ fleur panaché . .	—	Gestreiftblum. „ „	„	„	„	„
„ grand Papa . . .	—	Grosspapa's „ „	„	„	„	„
„ holosericea . . .	—	Sammetartige „ „	„	„	„	„
„ Louis XVIII. . .	—	Ludwig XVIII. „ „	„	„	„	„
„ nouvelle favorite .	—	Neue Liebling's „ „	„	„	„	„
„ Oeillet flamand. .	—	Flandrische Nelken „ „	„	„	„	„
„ panaché	—	Gestreifte „ „	„	„	„	„
„ Perle des Panachées	Vib.	Perle der Gestr. „ „	„	„	„	„
„ Pierre Janssens .	—	Peter Janssen's „ „	„	„	„	„
„ saturata variegata .	—	Reichlich bunte „ „	„	„	„	„
„ Soleil	—	Sonnen „ „	„	„	„	„
„ ténébreus. . . .	—	Finstere „ „	„	„	„	„
„ Toutain	—	Toutain's „ „	„	„	„	„
„ tricolor	—	Dreifarbige „ „	„	„	„	„
„ „ de Flandre . .	v. Houtt.	„ Flandrische „ „	„	„	„	„
„ Tuscany black. .	—	Schwarze Tosc. „ „	„	„	„	„
„ versicolor. . . .	—	Verschiedenfarb. „	„	„	„	„
„ „ pleno	—	Gefüllte „ „ „	„	„	„	„
„ Vitruvius	—	Vitruvius „ „	„	„	„	„
hybrida	—	Bastard „				
„ à fleurs roses . .	—	Rosenflor „ „	„	„	„	„
„ Aspidia	—	Aspidia „ „	„	„	„	„
„ Astrolabe . . .	—	Astrolabium „ „	„	„	„	„
„ bengal blanc . .	—	Weisse Bengal „ „	„	„	„	„
„ Bobelina	—	Bobelina's „ „	„	„	„	„
„ bonne Généviève .	—	Genovefa's „ „	„	„	„	„
„ bouquet blanc . .	—	Weisse Bouquet „ „	„	„	4—5'	„
„ Brennus	—	Brennus' „ „	„	„	„	„
„ Chatelain	—	Burgvogt's „ „	„	„	3—4'	„
„ Chenedolé . . .	—	Chenedolé „ „	„	„	4—5'	„
„ Comte Boubert . .	—	Graf Boubert's „ „	„	„	3—4'	„
„ Comtesse de Lacépéde.	—	Gräfin von Lacépéde's „ „	„	„	„	„
„ Corvisart	—	Corvisart's „ „	„	„	„	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
hybr. Coupe d'Hebe .	—	Hebes-Schale „ „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	3—4'	Hybr.
„ Daubenton . . .	—	Daubenton's „ „	„	„	„	„
„ Davoust	—	Davoust „ „	„	„	„	„
„ de lage	—	Vom See „ „	„	„	„	„
„ Devigne	—	Devigne's „ „	„	„	„	„
„ du Roi.	—	du Roi's „ „	„	„	„	„
„ Duc d'Anjou . .	—	Herz. v. Anjou's „ „	„	„	„	„
„ Duc Decazes . .	—	Herzog Decaz. „ „	„	„	„	„
„ Duc de Choiseuil .	—	Herzog von Choiseuil's „ „	„	„	„	„
„ Elisabeth Fry . .	—	Elisab. Fry's „ „	„	„	„	„
„ Général Bernard .	—	G. Bernard's „ „	„	„	„	„
„ „ Dauménil . . .	—	G. Dauménil's „ „	„	„	„	„
„ Georg IV. . . .	—	Georg IV. „ „	„	„	„	„
„ Great Western. .	—	Gross Western „ „	„	„	„	„
„ Jolante Fontaine .	—	Jol. Fontaine's „ „	„	„	„	„
„ Laffay	—	Laffay's „ „	„	„	„	„
„ la Nubienne. . .	—	Die Nubiennen „ „	„	„	„	„
„ Lascasas	—	Lascasas „ „	„	„	4—5'	„
„ Leroux	—	Leroux's „ „	„	„	3—4'	„
„ Lord John Russel	—	L. J. Russel's „ „	„	„	„	„
„ Lucretia	—	Lucretia's „ „	„	„	„	„
„ Mad. Plantier . .	—	Fr. Plantier's „ „	„	„	„	„
„ Maubach	—	Maubach's „ „	„	„	„	„
„ Miralba	—	Miralba's „ „	„	„	„	„
„ Nathalie	—	Nathalien's „ „	„	„	„	„
„ „ Daniel	—	Nath. Daniel's „ „	„	„	„	„
„ Pink	—	Nelken „ „	„	„	„	„
„ reine des hybrides	—	Königin der „ „	„	„	„	„
„ Riégo	—	Riégo's „ „	„	„	„	„
„ Rosalba	Vibert.	Rosaweisse „ „	„	„	„	„
„ Roxelana	—	Roxelana's „ „	„	„	„	„
„ semperfl. maxima .	—	Grosse immerblühende „ „	„	„	„	„
„ Triomphe de Guérin	—	Guérin's Triumph „ „	„	„	„	„
„ Ursule Devaux. .	—	Ursula Devaux „ „	„	„	„	„
„ Valerie Dubus . .	—	V. Dubus „ „	„	„	„	„
„ violette de Belgique	—	Belg. violette „ „	„	„	„	„
hybrida bifera. . .	—	Zweimalblüh. Bast.-Rosen, (Rosiers hybrides remontants)				
„ „ Amandine . . .	—	Amandinen's „ „ „	„	„	-	„
„ „ Aricie	—	Aricie's „ „ „	„	„	—	„
„ „ Aubernon . . .	—	Aubernon's „ „ „	„	„	—	„
„ „ Augustine Mouchelet. . .	—	Augustine Mouchelet's „ „ „	„	„	—	„
„ „ Baronne de Morel	Quetier	Baroness von Morel's „ „ „	„	„	—	„
„ „ „ Hallez de Claparède. . .	Thomas	„ Hallez von Claparède's „ „ „	„	„	—	„
„ „ „ Prevost . . .	—	„ Prevost „ „ „	„	„	—	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
hybr. bifera Bouton de Flor . . .	—	Blumenknospe" " "	12, C. 6, O.	Rosaceæ	—	Hybr.
" " Caroline de Sansal	Desprez	Caroline von Sansal's " " "	"	"	—	"
" " Charles Boissière.	Granger.	C. Boissière's " " "	"	"	—	"
" " Colonel Foissy. .	—	Oberst Foissy's" " "	"	"	—	"
" " Comte de Montalivet.	Lebou.	Graf von Montalivet's " " "	"	"	—	"
" " Comte de Paris .	—	G. v. Paris " " "	"	"	—	"
" " Comt. Duchatel .	Laff.	Gräfin Duchat. " " "	"	"	—	"
" " Cornet	—	Cornet's " " "	"	"	—	"
" " Cymedor . . .	Guillot.	Cymedor's " " "	"	"	—	"
" " Docteur Marx . .	—	Dr. Marx " " "	"	"	—	"
" " Dutchess of Sutherland . . .	Laff.	Herzogin von Sutherland " " "	"	"	—	"
" " Etendard de Marengo	—	Standarte von Marengo " " "	"	"	—	"
" " Géant d. batailles	Guillot.	Riese d.Schlacht " "	"	"	—	"
" " Général Castellane	"	G. Castellane's" " "	"	"	—	"
" " " Cavaignac . .	Margott.	" Cavaignac's" " "	"	"	—	"
" " " Changarnier .	Moulin.	" Changarn. " " "	"	"	—	"
" " " de Bréa . .	Margott.	" v. Bréa's " " "	"	"	—	"
" " Gloire des Rosamenes	—	Rosenglorie " " "	"	"	—	"
" " Jacques Laffitte .	Vibert.	Jac. Laffittes' " " "	"	"	—	"
" " Lady Alice Peel .	Laff.	Fr. Alice Peel's" " "	"	"	—	"
" " Lion des Combats	Lartay	Löwe d. Kampfes" "	"	"	—	"
" " Louis Bonaparte .	—	Lud. Bonaparte's " "	"	"	—	"
" " Mad. Damême . .	—	Fr. Damême's " " "	"	"	—	"
" " " de Lamoricière	Port.	" v. Lamoriciér. " " "	"	"	—	"
" " " Laffay . . .	—	" Laffay's " " "	"	"	—	"
" " " Rivers . . .	—	" Rivers' " " "	"	"	—	"
" " Marquise Boccella	—	Marq. Boccella's" " "	"	"	—	"
" " Mélanie Cornu . .	—	Mél. Cornu's " " "	"	"	—	"
" " Mère de St. Louis	Lacharm.	Mutter von St. Louis " " "	"	"	—	"
" " Mrs. Elliot . . .	—	Mrs. Elliot's " " "	"	"	—	"
" " Noëmi	—	Noëmi's " " "	"	"	—	"
" " Palais de Cristal .	Quetier	Kryst.-Pallast " " "	"	"	—	"
" " Pauline Plantier .	—	Paul. Plantier's" " "	"	"	—	"
" " Polybe	Laff.	Polybe's " " "	"	"	—	"
" " Pourpre royal, .	—	Königspurpur " " "	"	"	—	"
" " Prince Albert. .	—	Prinz Albert's " " "	"	"	—	"
" " Princesse Helene.	—	Prinzess Helen. " " "	"	"	—	"
" " Queen Victoria .	Paul.	Königin Victor. " " "	"	"	—	"
" " Reine des fleurs .	Portem.	" der Blumen " " "	"	"	—	"
" " " Mathilde . .	Oger.	" Mathilde's " " "	"	"	—	"
" " Robin Hood . .	—	Politische Kannegiesser " " "	"	"	—	"
" " Rose de la Reine .	Laff.	König. d. Rosen " " "	"	"	—	"
" " Soleil d'Austerlitz	—	Austerl.-Sonne " " "	"	"	—	"
" " Sidonie	Vibert.	Sidonia's " " "	"	"	—	"

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Rosa						
hyb. bif. William Griffith	Portem.	Wilh.Griffith's „ „ „	12, C. 6, O.	Rosaceæ	—	Hybr.
„ „ William Jess . .	—	„ Jessen's „ „ „	„	„	—	„
ind. burbonica Dubreuil	Neum.	Dubreuil's ind. Bourbon „	„	„	1—2′	„
ind. Noisettiana . .	Red.	Noisett's indische „	„	„	5—6′	Amerika
„ „ Desprez . . .	—	Desprez' „ „ „	„	„	4—5′	Hybr.
„ „ Kennedi . . .	—	Kennedi's „ „ „	„	„	3—4′	„
lutea Harrissonii . .	(Dalech.)	Harrisson's gelbe „	„	„	4—5′	„
„ fl. pleno	Wilton.	Gefüllte „ „	„	„	„	Persien
(persica lutea pl.) .						
lutea semipleno . .	—	Halbgefüllte „ „	„	„	„	Hybr.
pimpinellifolia . . .	L.	Pimpinellblättr. „	„	„	3—4′	S.-Eur.Engl.Schottl.
„ fl. pl. variet. . .	—	Gef. verschied. „ „	„	„	„	Hybr.
„ Stanwelli	—	Stanwell's „ „	„	„	„	„
rubifolia	(R. Br.)	Brombeerblättr. „	„	„	—	(Nord-Amerika)
„ Anna Marie . . .	Pierc.	Anna Marie's „ „	„	„	10—15′	Hybride
„ Beauté des Prairies	—	Schöne d.Prairie „ „	„	„	„	„
„ Belle de Baltimore .	—	„ v. Baltimore „ „	„	„	„	„
„ Caradori Allan .	Feasts.	Caradori Allan's „ „	„	„	„	„
„ Linnean Hill Beauty	—	Schönh.v.Linnean's Hügel „ „	„	„	„	„
„ Mrs. Hovey . . .	—	Mrs. Hovey's „ „	„	„	„	„
„ Perpetual Pink . .	—	Immerwährende nelkenartige „ „	„	„	„	„
„ Pride of Washington	—	Stolz v. Washington „ „	„	„	„	„
„ President	—	Präsident „ „	„	„	„	„
„ ranunculiflora . .	—	Ranunkelblüth. „ „	„	„	„	„
„ superba	—	Prächtige „ „	„	„	„	„
„ Triumphant . . .	—	Triumphirende „ „	„	„	„	„
„ Virginia Lass . .	—	Virg. Mädchen „ „	„	„	„	„
rubiginosa Hessoise .	—	Hessische Rost „	„	„	5—7′	(R.rubiginosa,Dschl.) Hybr.
„ Poniatowski . . .	—	Poniatowski's „ „	„	„	2—3′	„
Ruga	Lindl.	Ayrshire „	„	„	10—15′	Engl. Hybr.
Rubus	Plin.	Himbeere, (Brombeere)	12, C. 6, O.	Rosaceæ		
bellidiflorus fl. pl. .	Hort.	Gef. Masslieben-blüthige B.	„	„	10′	?
odoratus	L.	Wohlriechende H.	„	„	3—4′	Nord-Amerika
spectabilis	Pursh.	Ansehnliche „	„	„	2—3′	„
Salix	L.	Weide	22, C. 2, O.	Amentaceæ		
babylonica	L.	Trauer „	„	„	15—20′	Griechenland
nigra	Wahlenb.	Schwarze „	„	„	?	Nord-Amerika
(americana pendula .	Hort.)					

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Sambucus	Plin.	Hollunder . . .	5, C. 3, O.	Caprifoliaceæ		
nigra	L.	Gemeiner „	„	„	10—15′	Deutschland
„ laciniata	—	Geschlitzter „ „	„	„	„	
„ rotundifolia . . .	—	Rundblättriger „ „	„	„	„	
racemosa	L.	Trauben „	„	„	6—10′	S.-u.M.-Deutschl.
Sophora	L.	Sophora. . . .	10, C. 1, O.	Leguminosæ		
japonica	L.	Japanische „	„	„	15—20′	Japan
(Styphnolobium „ .	Schott.)					
Sorbus	L.	Eberesche . . .	12, C. 5, O.	Rosaceæ		
arbutifolia erythrocarpa	(Schauer.)	Rothfrücht. sandbeerblättr. „	„	„	2—3′	Virginien, Carol.
(Pyrus „	W.)					
Aucuparia	L.	Gemeine „	„	„	15—20′	Deutschland
(Pyrus „	Sm.)					
„ pendula	—	Hängende „ „	„	„		
hybrida	L.	Bastard „	„	„	15—20′	Thür., Schweiz
(Pyrus pinnatifida .	Ehrh.)					
vestita	Schauer.	Bekleidete „	„	„	10—20′	Nepal
(nepalensis	Lodd.)					
Spiraea	Theoph.	Spierstaude . .	12, C. 5, O.	Rosaceae		
alpina	Pall.	Alpen „	„	„	2—3′	Sibirien
ariaefolia	Sm.	Mehlbeerblättr. „	„	„	6—8′	Nord-Amerika
bella	Sims.	Schöne „	„	„	4—5′	Nepal
callosa	Lindl.	Schwielige „	„	„	3—4′	Japan
cana	Kit.	Graue „	„	„	1—2′	Croatien
capitata	Pursh.	Kopfförmige „	„	„	3—4′	Nord-Amerika
chamaedryfolia . .	L.	Gamanderblättr. „	„	„	„	Ungarn, Sibirien
corymbosa	Rafin.	Doldentraubige „	„	„	2—3′	Nord-Amerika
Douglasii	Hook.	Douglas' „	„	„	„	„
flexuosa	Fisch.	Gebogene „	„	„	„	Sibirien
hypericifolia . . .	L.	Hartheublättrige „	„	„	3—4′	S.-Eur., N.-Am.
„ crenata	Ser.	Gekerbte „ „	„	„	3—5′	Ungarn
(obovata	W. et K.)					
„ Savranica . . .	Ser.	Savranische „ „	„	„	2—3′	Podolien
(Savranica	Bess.)					
laevigata	L.	Glatte „	„	„	3—4′	Sibirien
opulifolia	L.	Schneeballblättr. „	„	„	8—10′	Nord-Amerika
prunifolia fl. pl. . .	Sieb. et Zucc.	Gef.pflaumenblä. „	„	„	3—4′	Japan, China
rotundifolia	Hort.	Rundblättrige „	„	„	„	Nord-Indien
(nepalensis	Hort.)					
salicifolia	L.	Weidenblättrige „	„	„	„	Sibir., S.-Deutshl.
„ paniculata . . .	W.	Rispenförmige „ „	„	„	„	
sorbifolia	L.	Ebereschenblätt. „	„	„	2—3′	Sibirien
thalictroides . . .	Pall.	Wiesenrautenblt. „	„	„	„	Daur. Alpen
triloba	L.	Dreilappige „	„	„	2—4′	Altaigebirge
ulmifolia	Scop.	Rüsterblättrige „	„	„	4—5′	Krain, Sibirien
Staphylea	L.	Pimpernuss . .	5, C. 3, O.	Celastrineæ		
pinnata	L.	Gefiederte „	„	„	10—20′	S.- u. Mittel-Eur. (Süd-Deutschl.)
Symphoria	Pursh.	Ballbeere, (Peterstrauch) . .	5, C. 1, O.	Caprifoliaceæ		
glomerata	„	Geknaulte „	„	„	2—3′	Nord-Amerika
racemosa	„	Traubenartige „	„	„	3—5′	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Syringa	Dodon.	Flieder, (Lilac)	2, C. 1, O.	Oleineæ		
chinensis	W.	Chinesischer „	„	„	6—10′	China
„ fl. rubro	—	Rother „ „	„	„	„	
Josikaea	Jacq. Fil.	Josika's „	„	„	„	Ungarn, Siebenb.
persica	L.	Persischer „	„	„	3—6′	Persien
„ fol. laciniatis	—	Geschlitzter „ „	„	„	„	
vulgaris	L.	Gemeiner „	„	„	10—15′	Pers., in Deutschland verwildert.
„ Carl X.	—	Carl X. „ „	„	„	6—10′	Hybr.
„ Duchesse d'Orl.	—	Herzogin von Orleans' „ „	„	„	„	„
„ fl. albo	—	Weisser „ „	„	„	10—15′	
„ fl. lilacino	—	Lilafarbiger „ „	„	„	„	„
„ Marly rouge	—	Roth. Marlysch. „ „	„	„	6—10′	„
Tamarix	Colum.	Tamariske	5, C. 3, O.	Tamariscineæ		
gallica libanotica	Lodd.	Libanotische „	„	„	6—8′	Libanon
Taxodium	Rich.	Eibencypresse	21, C. 8, O.	Coniferæ		
distichum	„	Zweizeilige „	„	„	10—20′	Virginien
(Cupressus „	L.)					
(Schubertia „	Salisb.)					
Taxus	L.	Eibenbaum	22, C. 1, O.	Coniferæ		
baccata	L.	Beerentragender „	„	„	20—30′	Italien, England, Sibir., Deutschl.
„ fol. varieg.	—	Buntblättriger „ „	„	„		
„ vart. fastigiata	Lindl.	Irländischer „	„	„	3—5′	Irland
(hibernica	Hook.)					
Tecoma	Juss.	Tecoma	14, C. 2, O.	Personatæ		
radicans major	„	Grosse wurzelnde „	„	„	15—20′	Virginien
(Bignonia „	L.)					
Thuja	L.	Lebensbaum	21, C. 8, O.	Coniferæ		
occidentalis	L.	Gemeiner „	„	„	15—20′	Nord-Amerika
Tilia	L.	Linde	13, C. 1, O.	Tiliaceæ		
argentea	D. C.	Silberfarbige „	„	„	20—30′	Ung., Griechenl.
(alba	W. et K.)					
argentea pendula	Hort.	Hängende „ „	„	„		
glabra	Vent.	Glattblättrige „	„	„	20—30′	Nord-Amerika
(americana	L.)					
grandifolia	Ehrh.	Grossblättrige „	„	„	40—60′	Deutschland
parvifolia	„	Kleinblättrige „	„	„	„	„
(europaea	L.)					
Ulmus	Virg.	Rüster	5, C. 2, O.	Ulmaceæ		
americana fol. aureo varieg.	(L.)	Buntblättriger amerikan. „	„	„	20—30′	(Nord-Amerika)
campestris	L.	Gemeiner „	„	„	60—90′	Deutschland
„ fol. varieg.	—	Buntblättriger „ „	„	„	30—40′	
„ planifolia pendula	Hort.	Hängender flachblättriger „ „	„	„		
„ suberosa	Koch.	Kork „	„	„	30—40′	„
effusa	W.	Langstieliger „	„	„	40—50′	„
Viburnum	Virg.	Schneeball	5, C. 3, O.	Caprifoliaceæ		
dentatum	L.	Gezähnter „	„	„	8—10′	Nord-Amerika

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Viburnum						
Lantana	L.	Wolliger „	5, C. 3, O.	Caprifoliaceæ	8—10′	Kaukasus, S.-u.M.-Deutschl.
Lentago	L.	Canadischer „	„	„	6—10′	Canada
Opulus	L.	Gemeiner „	„	„	10—15′	Deutschland
„ roseum	R. et Sch.	Gefüllter „ „	„	„	„	
prunifolium	L.	Pflaumenblättr. „	„	„	6—8′	Virgin., Canada
Vitis	L.	Weinstock	5, C. 1, O.	Ampelideae		
vinifera laciniata	(L.)	Geschlitztblättr. „	„	„	10—20′	(Asien, Persien)
Wistaria	Nutt.	Wistarie	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
chinensis	D. C.	Chinesische „	„	„	10—20′	China
(Glycine „	Sims.)					
frutescens	D. C.	Strauchartige „	„	„	6—10′	Nord-Amerika
(Glycine „	L.)					
Xanthorrhiza	Herit.	Gelbwurzel	5, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
apiifolia	„	Sellerieblättrige „	„	„	2—3′	Nord-Amerika
Zenobia	D. Don.	Zenobie	10, C. 1, O.	Ericeæ		
speciosa	D. et G. Don.	Prächtige „	„	„	1—2′	Virgin., Florida
(Andromeda „	Mich.)					
„ pulverulenta	Don.	Bestäubte „ „	„	„	„	Florida
„ viridis	Duham.	Grüne „ „	„	„	„	

Einjährige Pflanzen.

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Adonis	Matth.	Adonis	13, C. 6, O.	Ranunculaceæ		
autumnalis	L.	Herbst „	„	„	2′	Eur. (in Deutschl. verwildert)
Ageratum	L.	Ageratum . . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
conyzoides vart. mexicanum . .	(L.)	Mexikanisches Dürrwurzart. „	„	„	1—1½′	Mexico
Alyssum	Diosc.	Steinkraut . .	15, C. 1, O.	Cruciferæ		
odoratum	?	Wohlriechendes „	„	„	1′	?
Amaranthus . . .	Matth.	Amaranth . . .	21, C. 5, O.	Amaranthaceae		
caudatus	L.	Geschwänzter „	„	„	3—4′	Persien, Peru
sanguineus	L.	Blutrother „	„	„	4′	Bahamainseln
Amberboa	Adans.	Bisamblume . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
moschata	D. C.	Gemeine „	„	„	2—3′	Orient, Griechenl.
(Centaurea „	L.)					
odorata	D. C.	Wohlriechende „	„	„	„	Orient
(Centaurea suaveolens	W.)					
Anoda	Cav.	Anoda.	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
Dilleniana	Cav.	Dillen's „	„	„	3′	Mexico
(Sida „	W.)					
Baeria	Fisch. et Mey.	Baerie	19, C. 2, O.	Compositæ		
chrysostoma . . .	„	Goldgelbe „	„	„	½′	Neu - Californien
Balsamina	Riv.	Balsamine . . .	5, C. 1, O.	Balsamineæ		
hortensis fl. pl. . .	Desp.	Gef. Garten „	„	„	1—2′	Ost-Indien
(Impatiens Balsamina	L.)					
Bartonia	Lewis.	Bartonie . . .	13, C. 1, O.	Loaseæ		
aurea	Lindl.	Goldgelbe „	„	„	1—1½′	Californien
Brachycome . . .	Cass.	Kurzschopf . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
iberidifolia	Benth.	Schleifenblumenblättrige „	„	„	1′	Neu-Holland
Briza	L.	Zittergras . . .	3, C. 2, O.	Gramineæ		
maxima	L.	Grösstes „	„	„	1′	Süd-Europa
Browallia	L.	Browallie . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
elata	L.	Hohe „	„	„	2′	Peru
Calliopsis	Reichb.	Schönauge. . .	19, C. 3, O.	Compositæ		
Drummondi	Hook.	Drummond's „	„	„	2½′	Nord-Amerika
tinctoria	D. C.	Färber „	„	„	3′	„
„ fusca	—	Braunrothes „ „	„	„	„	
Callistephus . . .	Cass.	Schönkranz . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
chinensis fl. pl. . .	Nees.	Gef. chinesischer „	„	„	1—2′	China, Japan
(Aster „	L.)					
Carthamus	L.	Saflor.	19, C. 1, O.	Compositæ		
tinctorius	L.	Färber „	„	„	3′	Egypten

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Celosia	Trag.	Hahnenkamm	5, C. 1, O.	Amaranthaceæ		
cristata	L.	Gemeiner „	„	„	1—2′	O.-Indien, China
Centranthus	D. C.	Spornblume	1, C. 1, O.	Valerianeæ		
macrosiphon	Boiss.	Grossröhrige „	„	„	1½′	Spanien
Charieîs	Cass.	Charieîs, (Anmuthblume)	19, C. 2, O.	Compositæ		
heterophylla	„	Verschiedenblät. „	„	„	½′	Cap
(Kaulfussia amelloides	Nees.)					
Cheiranthus	L.	Goldlack	15, C. 2, O.	Cruciferæ		
Cheiri fl. pl.	L.	Gef. gemeiner „	„	„	1—2′	(Süd-Europa) (Süd-Deutschl.)
Chrysanthemum	L.	Wucherblume	19, C. 2, O.	Compositæ		
carinatum	Schousb.	Gekielte „	„	„	3′	Berberei
Clarkia	Pursh.	Clarkie	8, C. 1, O.	Onagrariæ		
pulchella	„	Zierliche „	„	„	1′	Californien
Collinsia	Nutt.	Collinsie	14, C. 2, O.	Personatæ		
bicolor	Benth.	Zweifarbige „	„	„	½′	Californien
multicolor	Lindl.	Vielfarbige „	„	„	1′	„
Convolvulus	Plin.	Winde	5, C. 1, O.	Convolvulaceæ		
purpureus versicolor	(L.)	Verschiedenfarb. purpurrothe „	„	„	6—10′	(Mittel-Amerika)
(Ipomoea „	Lam.)					
tricolor	L.	Dreifarbige „	„	„	2′	Span., Sicilien
Cynoglossum	Diosc.	Hundszunge	5, C. 1, O.	Boragineæ		
linifolium	L.	Flachsblättrige „	„	„	1′	Portugal
Delphinium	Tourn.	Rittersporn	13, C. 3, O.	Ranunculaceæ		
Ajacis pumila	(L.)	Garten-Zwerg „	„	„	1—1½′	Taurien
Consolida fl. pl.	(L.)	Gef. Feld „	„	„	2—3′	(Deutschland)
Dimorphotheca	Vail.	Dimorphotheca	19, C. 4, O.	Compositæ		
pluvialis	Moench.	Regenanzeigende „	„	„	1—1½′	Cap
(Calendula „	L.)					
Dracopsis	Cass.	Drachenauge	19, C. 3, O.	Compositæ		
amplexicaulis	„	Stengelumfass. „	„	„	3′	Mex., Louisiana
(Rudbeckia „	Vahl.)					
Emilia	Cass.	Emilie	19, C. 1, O.	Compositæ		
sonchifolia	D. C.	Gänsedistelblätt. „	„	„	1½′	O.-Indien, China
(Cacalia „	L.)					
Erysimum	Diosc.	Hederich	15, C. 2, O.	Cruciferae		
Perowskianum	Fisch. et Mey.	Perowsky's „	„	„	2′	Kabul, (Afghanistan)
Eschscholtzia	Cham.	Eschscholtzie	13, C. 1, O.	Papaveraceæ		
californica	Lindl.	Californische „	„	„	1½′	Californien
tenuifolia	Benth.	Schmalblättrige „	„	„	¾′	„
Eutoca	R. Br.	Eutoca	5, C. 1, O.	Cordiaceæ		
viscosa	Benth.	Klebrige „	„	„	1′	Californien
Gamôlepis	Less.	Bindschuppe	19, C. 2, O.	Compositæ		
Tagetes	D. C.	Tagetesartige „	„	„	½′	Cap
Gomphrena	L.	Kugelamaranth	5, C. 1, O.	Amaranthaceae		
globosa	L.	Kugelrunder „	„	„	1—1½′	Ost-Indien

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Helenium	L.	Helenie	19, C. 2, O.	Compositæ		
tenuifolium	Nutt.	Schmalblättrige „	„	„	1½—2′	Texas
Helichrysum . . .	D. C.	Sonnengold (Strohblume) .	19, C. 2, O.	Compositæ		
bracteatum	W.	Beblättertes „	„	„	3—4′	Neu-Holland
Hibiscus.	Diosc.	Eibisch	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
calisurus	B. M.	Schönschweifiger„	„	„	2′	?
Iberis	L.	Schleifenblume	15, C. 1, O.	Cruciferæ		
lusitanica	Hort.	Portugisische „	„	„	1′	Portugal
umbellata	L.	Doldentragende „	„	„	1′	Italien, Spanien
Jonopsidium . . .	D. C.	Veilchengesicht	15, C. 1, O.	Cruciferæ		
acaule.	Rchb.	Stengelloses „	„	„	¼′	Portugal, N.-Afr.
Lathyrus	L.	Platterbse . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
odoratus versicolor .	L.	Verschiedenfarb. wohlriechende „	„	„	4—6′	Sicilien
tingitanus	L.	Tangerische „	„	„	„	Mauritanien
Lavatera	Tourn.	Lavatere . . .	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
trimestris fl. albo. .	L.	Weisse Garten „	„	„	4′	Süd-Europa
„ fl. rubro . . .	—	Rothe „ „	„	„	„	
Leptôsiphon . . .	Benth.	Dünnröhre. . .	5, C. 1, O.	Polemoniaceæ		
aureus	Lobb.	Goldgelbe „	„	„	½′	Californien
densiflorus	Benth.	Dichtblüthige „	„	„	1′	„
Linaria	Vent.	Leinkraut . . .	14, C. 2, O.	Personatæ		
bipartita	W.	Zweitheiliges „	„	„	1—1½′	Marokko
Lobelia	L.	Lobelie	5, C. 1, O.	Lobeliaceæ		
heterophylla major .	Labill.	Grosse verschiedenblättrige „	„	„	1′	Neu-Holland
pubescens	Ait.	Weichhaarige „	„	„	½′	Cap
Lonas	Adans.	Lonas	19, C. 1, O.	Compositae		
inodora	Gärt.	Geruchlose „	„	„	1—1½′	Berberei
(Athanasia annua .	L.)					
Lupinus	L.	Wolfsbohne . .	17, C. 6, O.	Leguminosæ		
mutabilis	Sweet.	Veränderliche „	„	„	4—5′	Columbien
nanus	Dougl.	Zwerg „	„	„	1′	Californien
Malope	L.	Malope	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
trifida grandiflora .	(Cav.)	Grossblumige dreispaltige „	„	„	3—4′	(Süd-Europa)
Malva	Plin.	Malve.	16, C. 9, O.	Malvaceæ		
mauritiana	L.	Mauritanische „	„	„	5—6′	Italien, Span.
Matthîola	R. Br.	Matthiole . . .	15, C. 2, O.	Cruciferæ		
annua fl. pl. . . .	R. Br.	Gef. Sommer „	„	„	1—1½′	(Süd-Europa)
(Cheirantus „	L.)	(Levkoje)				
incana fl. pl. . . .	R. Br.	Gef. Winter „	„	„	2—3′	„
(Cheiranthus „	L.)	(Levkoje)				
Melampodium . .	L.	Geissfuss . . .	19, C. 4, O.	Compositæ		
macranthum . . .	Hort.	Grossblumiger „	„	„	2′	Mexico?
Mesembrianthemum	Dill.	Mittagblume (Zaserblume) .	12, C. 5, O.	Mesembrinæ		
tricolor	W.	Dreifarbige „	„	„	¼′	Cap
Nemôphila	Bart.	Hainliebe . . .	5, C. 1, O.	Cordiaceæ		
insignis	Lindl.	Ausgezeichnete „	„	„	¼′	Californien
maculata.	Benth.	Gefleckte „	„	„	⅓′	„

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Nigella	Trag.	Schwarzkümmel	13, C. 5, O.	Ranunculaceæ		
damascena	L.	Damascener „	„	„	2'	Süd-Europa
Nolana	L.	Zymbelblume .	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
atriplicifolia. . . .	Don.	Meldenblättrige „	„	„	1/4'	Chile, Peru
Oenothera	L.	Nachtkerze . .	8, C. 1, O.	Onagrariæ		
rubicunda	Dougl.	Rothe „	„	„	1—2'	Nord-Amerika
Oxyura	D. C.	Spitzschwanz .	19, C. 2, O.	Compositæ		
chrysanthemoides .	D. C.	Wucherblumen-artiger „	„	„	1/2—1'	Californien
Papaver	Virg.	Mohn	13, C. 1, O.	Papaveraceæ		
somniferum fl. pl. . .	L.	Gef. Garten „	„	„	3—4'	Griechenl. Egypt.
Petunia	Juss.	Petunie	5, C. 1, O.	Solanaceæ		
nyctaginiflora . . .	„	Nyctagoblüthige „	„	„	2—3'	Süd-Amerika
Phlox	L.	Flammenblume.	5, C. 1, O.	Polemoniaceæ		
Drummondii . . .	Hook.	Drummond's „	„	„	1—2'	Texas
Picridium	Desf.	Bitterkraut . .	19, C. 1, O.	Compositæ		
tingitanum	Desf.	Tangerisches „	„	„	1'	N.-Afrika, Sicil.
(Sonchus „	Lam.)					
Polygonum . . .	L.	Knöterig . . .	8, C. 3, O.	Polygoneæ		
orientale	L.	Morgenländisch. „	„	„	5—6'	Orient
Portulaca	Plin.	Portulac . . .	11, C. 1, O.	Portulaceæ		
grandiflora	Hook.	Grossblumiger „	„	„	3/4'	Chile
Reseda	Plin.	Resede	11, C. 3, O.	Resedaceæ		
odorata	L.	Wohlriechende „	„	„	1'	Egypten
Sanvitalia	Gualt.	Sanvitalie . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
procumbens. . . .	Lam.	Liegende „	„	„	1/4'	Mexico
Scabiosa	Vaill.	Scabiose . . .	4, C. 1, O.	Dipsaceæ		
atropurpurea . . .	L.	Schwarzrothe „	„	„	2—3'	Ost-Indien
(Asterocephalus „	Spr.)					
Schizanthus . . .	R. et P.	Spaltblume . .	2, C. 1, O.	Personatæ		
pinnatus	„	Gefiederte „	„	„	2'	Chile
Senecio	L.	Kreuzkraut . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
elegans fl. pl. . . .	L.	Gef. schönes „	„	„	2'	Cap
Silene	Lobel.	Silene	10, C. 3, O.	Caryophylleæ		
Armeria	L.	Garten „	„	„	1'	Süd-Deutschl.
Bergerii	Schott.	Berger's „	„	„	1 1/2'	Italien
pendula	L.	Hängende „	„	„	1/2'	Italien, Sicilien
Specularia	Heist.	Spiegelblume .	5, C. 1, O.	Campanulaceæ		
Speculum	A. D. C.	Gemeine „	„	„	1/2—1'	Süd-Europa
(Campanula „	L.)					
(Prismatocarpus „	Herit.)					
Sphenôgyne . . .	R. Br.	Keilstempel . .	19, C. 4, O.	Compositæ		
speciosa	Mannd.	Prächtiger „	„	„	1'	Süd-Amerika
Tagetes	L.	Sammetblume .	19, C. 2, O.	Compositæ		
erecta pl.	L.	Gef. Aufrechte „	„	„	1 1/2—3'	Mexico
patula nana pl. . .	L.	Gef. Ausgebreit. „	„	„	1—3'	„
„ „ lutea pl. . .	—	Gelbgefüllte „ „	„	„	1 1/2'	
Tolpis	Bivona.	Tolpis	19, C. 1, O.	Compositæ		
barbata	Gärt.	Bartige „	„	„	1—2'	Sicil., S.-Frankr.
(Crepis „	L.)					
Tropaeolum . . .	L.	Capuzinerkresse	8, C. 1, O.	Tropaeoleæ		
aduncum	Sm.	Hakenförmige „	„	„	6—10'	Peru

Namen der Gattung und Art.	Autor.	Deutscher Namen.	Classe und Ordnung.	Familie.	Höhe.	Vaterland.
Tropaeolum						
majus	L.	Grosse „	8, C. 1, O.	Tropaeoleae	6—10′	Peru
Viola	L.	Veilchen . . .	5, C. 1, O.	Violariæ		
tricolor maxima . .	(L.)	Grosses dreifarbiges „	„	„	1/4′	(Deutschland)
Viscaria	Röhl.	Klebnelke . . .	10, C. 4, O.	Caryophylleæ		
oculata	Lindl.	Geäugelte „	„	„	1—1 1/2′	Nord-Afrika
Whitlavia	Harvey.	Whitlavie . . .	5, C. 1, O.	Cordiaceæ		
grandiflora	Harv.	Grossblumige „	„	„	3/4′	Californien
Xeranthemum . .	Tourn.	Spreublume . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
radiatum	Lam.	Gestrahlte „	„	„	2—3′	Ital., Nied.-Oestr.
Ximenesia	Cav.	Ximenesie . . .	19, C. 2, O.	Compositæ		
encelioides	Cav.	Geöhrte „	„	„	3—4′	Mexico
Zinnia	L.	Zinnie	19, C. 2, O.	Compositæ		
elegans versicolor .	Jacq.	Verschiedenfarb. schöne „	„	„	3′	Mexico

Weinsorten.

Früher Leipziger, (Gelbe Seidentraube)
Früher Gutedel, (Diamant)
Weisser „
Rother „
Pariser „ (Chasselas Fontainebleau)
Königs „
Geschlitzter „
Blauer Bloussard, (Schwarzer Hamburger)
Blauer Arbst,
Blauer Clävner, (Blauer Burgunder)
Frühe Lahntraube,
Früher weisser Malvasier,
Verdal,
Rother Muscateller,
Blauer Trollinger, (Blauer Frankenthaler).

Druck der Hinstorff'schen Buchdruckerei in Ludwigslust.